

DROP

NOT A TERRESTRIAL

NOT IN B & C 87
NEVER ASSIGNED TO GENUS TERRESTRA

G. VIII. 13. Buccinum sinuatum.

G. VIII. 13. Die Faltenmadel.

Testa turrata anfractibus longitudinaliter plicatis, prope suturam attenuatis, labro postice sinuato.

Die getürmte nach der Länge gefaltene Madel hat an der Nath zusammengedrückte Gewinde, und eine hinten ausgeschnittene Schalenleuze.

BORN 1778 p 264

Mart. Konch. Kab. IV, 155 u. 1464. 1465. f.

Testa turrata. Anfractus circiter novem, longitudinaliter plicati, prope suturam complanati. Labrum replicatum, postice sinu brevi excisum. Columella replicata. Apertura, & basis congenerum. Color lutescens, epidermide decidua nigra.

Die Schale ist getürmt. Die Gewinde, deren ungefehr neun sind, der Länge nach gefalten, nächst der Nath platt gedrückt. Die Schalenleuze ist erweitert, und hinten mit einem kurzen Einschnitte versehen. Die Spindel ist übergeschlagen. Die Mündung, und der Grund, wie an andern Spindeln dieses Geschlechtes. Von gelblicher Farbe mit schwarzer abfallender Oberhaut.

BORN 1779 p 264

BUCCINUM SINUATUM.

Germ. Die Faltenmadel.

Testa turrata, anfractibus longitudinaliter plicatis, prope suturam attenuatis, labro postice sinuato.

MARTINI Konch. Kab. IV. tab. 155. f. 1464.

Testa turrata; Anfractus circiter novem longitudinaliter plicati, prope suturam complanati; Labrum explanatum, postice sinu brevi excisum; Columella replicata; Apertura & basis congenerum; Color lutescens, epidermide decidua nigra.

Long. 2. poll. 5. lin. lat. 1. poll. 9. lin.

Patria ignota.

BORN 1779 p 268

SINUATUM. 154. Shell turreted, with the whirls longitudinally plaited, and attenuated near the sutures; aperture emarginate at both ends.

Buccinum sinuatum. Born Mus. p. 268.

Buccinum Phallus. Gmelin, p. 3503. Schreibers Conch. i. p. 172.

Buccinum, No. 179. Schroeter Einl. i. p. 403.

Martini, iv. p. 307. t. 155. f. 1464 and 1465.

Inhabits the East Indies, in rivers?

Shell near two inches and a half long, and an inch and three-quarters broad, thin, semi-transparent, covered with a brown or black epidermis, under which it is blackish or reddish, and the ribs are sometimes white; the spire has nine whirls, and the ribs are slightly curved.

DICLW 1772 268