

COQUILLAGES

du Gabon



SHELLS

of Gabon

Pierre A. Bernard

Première édition 1984
Reproduction interdite
sans autorisation écrite
de l'éditeur


*First printed 1984
All rights reserved, including
the right of reproduction
in whole or in part.*

Copyright Pierre A. Bernard, 1984

Pierre A. Bernard
B.P. 3751
Libreville - Gabon

TEREBRIDAE

- 172 - **Hastula aciculina** (Lamarck, 1822) - mm. 32 - R - sable - 0-1 m.
Plus connue comme *Terebra micans* Hinds, cette coquille brillante et allongée se trouve sur toutes les côtes sableuses dans la zone battue par les vagues.
More commonly known as Terebra micans Hinds, this shiny elongated shell can be found along all the sandy coasts, in the area beaten by the waves. Pl. 46
- 173 - **Hastula knockeri** (Smith, 1872) - mm. 23.4 - RR - sable - 1-4 m.
Un seul exemplaire a été trouvé mort près de l'île Banié. La coquille est allongée avec de fines côtes axiales, elle est ornée d'une bande plus claire sous la suture.
Only one specimen found dead near the Island of Banié. The shell is elongated with fine axial ribs and has a lighter band under the suture. p. 92
- 174 - **Hastula leloeuffi** Bouchet, 1983 - mm. 26.3 - RR - sable - ?
Coquille très allongée, brillante avec de fines côtes axiales, de couleur crème. Un seul exemplaire trouvé mort près de l'île Banié.
Very elongated shell, shiny with fine axial ribs, colour cream. Only one specimen found dead near Island of Banié. Pl. 46
- 175 - **Terebra concinna** (Deshayes, 1857) - mm. 50.3 - NC - sable - 2-5 m.
Coquillage allongé orné de côtes axiales bien apparentes, coloration variant de jaunâtre à gris clair avec des taches brunes séparées dans la zone sous-suturale. Trouvé près de l'île Banié, au C. Esterias et dans l'estuaire du Komo.
Elongated shell with well evident axial ribs, colour varies from yellowish to light grey with brown blotches separated in the sub-sutural zone. Found near the Island of Banié, at C. Esterias and in the Komo estuary. Pl. 46
- 176 - **Terebra corrugata** (Lamarck, 1822) - mm. 128 - R - sable - 20-50 m.
La plus belle térébre ouest-africaine, injustement oubliée par la littérature malacologique. Coquille très fine, ornée d'un cordon sous-sutural à nodosités très marquées, d'une petite bouche et de taches brunes sur fond beige clair. Chalutée dans la zone équatoriale.
The most beautiful West African terebra, unjustly forgotten by malacological literature. Very fine shell, with a sub-sutural cordon with well evident knobs, a small mouth and brown blotches on a light beige background. Trawled in the equatorial zone. Pl. 46
- 177 - **Terebra reticulare** (Pecchioli, 1891) - mm. 58.7 - RR - sable - 20-50 m.
Coquille très allongée avec de nombreuses côtes axiales sur chaque tour et de nombreux tirets spiraux entre les côtes. On observe des nodosités bien marquées dans le cordon sous-sutural. Deux exemplaires chalutés dans la zone équatoriale.
Very elongated shell with numerous axial ribs on each whorl and numerous spiral dashes between the ribs. Well evident knobs can be seen on the sub-sutural cord. Two specimens trawled in the equatorial zone. Pl. 46
- 178 - **Terebra senegalensis** (Lamarck, 1822) - mm. 99.4 - NC - sable - 2-5 m.
C'est sans doute la plus connue des térébres ouest-africaine. La coquille est grande souvent défectueuse, presque lisse avec un cordon spiral sous la suture. Coloration cornée avec des flammules brunes irrégulièrement réparties. Toutes les zones sableuses.
Without doubt the best known West African terebra. The shell is large, never perfect, almost smooth with a spiral cord under the suture. Horny colour with irregularly arranged brown flames. All sandy areas. Pl. 46



173 - *Hustula knockeri* (x 3.5)




197 - *Drillia* sp. (x 3.5)

Pl. 42 (x 0.8)




Pl. 43 (x 4)



198 - *Drillia* cf. *coerulea* (x 4.9)



Pl. 46 (x 0.7)



Pl. 47 (x 0.8)

