



Ignatii a Born. Eqv.

Academiae Imp. Naturae Curiosorum, Petropolit.  
Londinens. Holmens. Göttingens. Upsaliensis. Lendin.  
gothorum, Senens. Monacensis, Burghaus. Sata.  
vinæ nec non Physicorum Berolinensium Sodalit.

INDEX  
Rerum Naturalium  
Musei  
Caesarei Vindobonensis  
Pars I.<sup>ma</sup>  
Testacea

---

Verzeichniß  
Der natürlichen Seltenheiten  
des k. k.  
Naturalien Cabinets  
zu Wien  
Erster Theil  
Schalthiere

Vindobonae, ex Officina Krausiana 1778.



replicatum tenue. Basis desinens in canalem, breuem recurvam. Color glaucus.

ist raget hervor. Die Schale ist gefaltet, und inwendig gefurchet. Die innere Lesze ist übergeschlagen, und dünn. Der Grund erblühet sich in einen kurzen gekrümmten Schnabel. Von tiefer grauer Farbe.

G. VIII. Turrita, laevis, subulata. G. VIII. Gethürmte, glatte, abtsförmige Kinkhörner.

G. VIII. I. Buccinum maculatum. G. VIII. I. Die Striftnadel.

Belg. Malpriein. Angl. Tygers-tooth. Petiv. Gall. Le Cloud. Argem.

Testa turrita subfusiformi, anfractibus laevis, indivis, integerrimis. Die gethürmte einigermassen spindelartige Schale hat glatte ungetheilte, und ganzrandige Gewinde.

Pallida, maculis latis purpurascens. Blasi, mit breiten purpurrothen hellen Flecken.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 317.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 74.

Rumph. amb. t. 30. f. A. D.

Petiv. amb. t. 5. f. 4.

Gualt. Test. t. 56. f. 3.

Argem. Conch. Pl. II. f. A.

Seb. Thes. III. t. 56. f. 6.

Knor. Vergn. III. 23. t. 2. f.

— — VI. 19. t. 6. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 153. t. 1440. f.

G. VIII.



G. VIII. 2. Buccinum subulatum. G. VIII. 2. Die Tiger-nadel.

Linn. S. N. Sp. 480.

Belg. Dunne Tygerpen. Angl. Brown Tygers horn. Petiv. Gall. Vis tigrée. Dav.

Testa turrita subulata, anfractibus laevis, indivis, ferrie duplici macularum ferruginearum pictis. Die gethürmte spindelförmige Schale hat glatte ungetheilte Gewinde, die mit einer dreifachen Reihe rostfarbiger Flecken bemalt sind.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 118.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 70.

Rumph. amb. 30. t. B.

Petiv. amb. t. 4. f. 2.

Gualt. Test. t. 56. f. B.

Argem. Conch. Pl. II. f. X.

Seb. Thes. III. t. 56. f. 28.

G. VIII. 3. Buccinum candidum. G. VIII. 3. Die weiße Nadel.

Testa turrita subulata laevi; anfractibus integerrimis, prope suturam incrassatis. Die gethürmte abtsförmige glatte Schale hat ungetheilte ganzrandige Gewinde, die bei der Naht sich verdicken.

Mus. Caes. Vindobon.

R

Testa



Testa subulata lacuis. Anfractus circiter viginti, indivisi, integerrimi, supra prope futuram incrassati; supremi linea transuersa bifariam partiti, & juxta futuram crenulati. Apertura, & basis congenerum. Color niveus.

Die abtsförmige Schale ist glatt. Die Gewinde, deren beständig zwanzig sind, nahe an der Muth. Die obersten sind durch eine neue Quertlinie in zwey Theile getheilt, und an der Muth gekerbet. Die Mündung und der Grund sind wie an den Nebenarten beschaffen. Die Farbe schneeweiß.

G. VIII. 4. Buccinum ferrugineum.

G. VIII. 4. Die rostfarbige Nadel.

Testa turrita subulata ferruginea, anfractibus lacuibus, bipartitis, integerrimis.

Die gethürmte abtsförmige rostfarbige Schale ist glatt, zweytheilig und ganzrandig.

List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 71.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa subulata, lacuis. Anfractus circiter sexdecim integerrimi, linea exarata transuersa bifariam indivisi. Apertura & basis congenerum. Color ferrugineus, maculis obsoletis albis.

Die Schale ist abtsförmig, und glatt. Die Gewinde bäuchig, ganzrandig, und zweytheilig; sechszehn an der Zahl. Die Mündung und der Grund nach Art der Unverzandten. Von eisenrothiger Farbe, mit matten weißen Flecken.

G. VIII. 5. Buccinum crenulatum.

Linn S. N. Sp. 481.

G. VIII. 5. Die gekrönte Nadel.

Belg. Gekartelde Pen. Rumph. Angl. Tooth'd Rodkin. Pet.

Testa



Testa turrita, anfractibus bipartitis, margine superiore zweytheilige am Oberrande gekerbte Bindungen.

List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 75.

Rumph. amb. t. 30. f. E.

Petiv. amb. t. 8. f. 13.

Gualt. Test. t. 57. f. L.

Argenv. Conch. Pl. II. f. Y.

Seb. Thes. III. t. 56. f. 9. 35.

Knor. Vergn. I. 8. t. 7. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 153. t. 1442. f.

G. VIII. 6. Buccinum vittatum.

G. VIII. 6. Die gekerbte Nadel.

Linn. S. N. Sp. 483.

Testa ventricoso turrita, transuersim striata, sutura anfractuum duplicato crenulata, und an der Muth zweysach gekerbet.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 34.

Klein. Meib. Ostr. t. 7. f. 121.

Mart. Konch. Konch IV. 195. t. 1461. f.

R 2

G. VIII.



G. VIII. 7. Buccinum strigilatum. G. VIII. 7. Die gestriegelte Nadel.

*Linn. S. N. Sp. 484.*

*Belg. Naalde - Pen. Gall. Le Foret. Dav.*

Testa subulata longitudinaliter striata, anfractibus indivisis, cingulo suturali niuvo rufo maculato.

Die ahlförmige Schale hat ungetheilte nach der Länge gestreifte Gewinde, die an der Nath mit einem schneeweißen rothbraun gefleckten Bande umgeben sind.

*Rumph. amb. t. 30. f. H.*

*Gualt. Test. t. 57. f. O.*

*Argenv. Conch. Pl. II. f. R.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

G. VIII. 8. Buccinum duplicatum. G. VIII. 8. Die Nähel.

*Linn. S. N. Sp. 485.*

*Gall. La Vis de pressoir. Dav.*

Testa subulata anfractibus bipartitis, striatis.

Die ahlförmige Schale hat zweytheilige, gestreifte Windungen.

*Bonap. Recr. cl. 3. f. 110.*

*Gualt. Test. t. 57. f. N.*

*Knor.*



*Knor. Vergn. VI. 18. t. 6. f. 24. t. 5. f. 25*  
*Mart. Konch. Kab. IV. 155. t. 1455. f.*

G. VIII. 9. Buccinum lanceolatum. G. VIII. 9. Die Lanzennadel.

*Linn. S. N. Sp. 486.*

*Belg. Piekenier. Angl. Furrow - Pen. Pet. Gall. L'alène. Dav.*

Testa subulata laevi, anfractibus integris, lineis longitudinalibus fulvis.

Die ahlförmige glatte Schale hat ungetheilte Gewinde, die mit rothgelben Streifen nach der Länge herab bezeichnet sind.

*Rumph. amb. t. 30. f. G.*

*Petiv. Gaz. t. 13. f. 20.*

*Argenv. Conch. Pl. II. f. Z.*

*Knor. Vergn. VI. 24. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 154. t. 1450. f.*

G. VIII. 10. Buccinum dimidiatum. G. VIII. 10. Die ungewundene Nadel.

*Linn. S. N. Sp. 487.*

*Belg. Omwonden P. n.*

Testa subulata laevi, anfractibus bipartitis integerrimis.

Die ahlförmige glatte Schale hat zweytheilige ganzrandige Gewinde.

R 3

“ 112-



macularum crocearum serie trans-  
versa triplici picta.

mit dreysacher Reihe safranfar-  
bigen Flecken in die Quere be-  
malt.

Seb. Thes. III. t. 56. f. 16, 23, 24, 27.

Knor. Verg. I. 23. t. 4. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 154. t. 1443. f.

lutescens, maculis longitudina-  
libus nuceis, anfractuum margi-  
ne superiore compresso attenua-  
to.

gelblich, mit länlichen schnee-  
weißen Flecken, und plattgedrück-  
tem verdünntem Oberrende an den  
Gewinden.

Rumph. amb. t. 30. f. C.

Gualt. Test. t. 51. f. M.

Seb. Thes. III. t. 56. f. 15, 19.

Knor. Vergn. I. 23. t. 5. f.

— — VI. 18. t. 5. f.

G. VIII. 11. Buccinum  
cinereum.

G. VIII. 11. Die aschen-  
graue Nadel.

Testa subulata; anfractibus  
indivisis; prope suturam longi-  
tudinaliter striatis.

Die abtförmige Schale hat  
ungetheilte, und an der Naht  
nach der Länge gestreifte Ge-  
winde.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa



Testa subulata glabra. Anfractus  
quatuordecim indivisi, integerrimi,  
margine superiore longitudinaliter  
striati. Columella complanata. Aper-  
tura, & basis congenerum. Color  
cinereus; fascia transversa prope  
suturae nigrescente obsoleta.

Die Schale ist abtförmig und glatt.  
Die vierzehn Gewinde sind einge-  
theilt, ganz glatt, und nur an  
der Naht der Länge nach gestreift.  
Die Spindel flach gedrückt. Die  
Mündung und der Grund wie an den  
Nebenarten dieses Geschlechtes. Von  
aschengeauer Farbe, mit einer un-  
deutlichen schwärzlichen Querbinde  
unweit der Naht.

G. VIII. 12. Buccinum  
pertulum.

G. VIII. 12. Die durch-  
stochene Nadel.

Testa subulata; anfractibus  
bipartitis, striis longitudina-  
libus elevatis, & transversis  
excavato punctatis.

Die abtförmige Schale hat  
zweytheilige Gewinde, die nach  
der Länge herab erhabene Strei-  
fen, und in die Quere vertief-  
te Punkten haben.

Mart. Konch. Kab. IV. 155. t. 1457. f.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa subulata. Anfractus circiter  
viginti striati, striis longitudinali-  
bus elevatis, punctisque excavatis  
per seriem transversam digentis.  
Apertura & basis congenerum. Co-  
lor croceus aut albus, maculis dif-  
fusiis saluis.

Die Schale ist abtförmig. Die  
Gewinde, deren ungefehr zwanzig  
sind, haben der Länge nach erha-  
bene Streifen, und in die Quere  
eine dreysache Reihe ausgehöhlter  
Punkten. Die Mündung, und der  
Grund ist wie an den andern Na-  
deln dieses Geschlechtes. Von sa-  
franfarbiger, oder weißer Farbe mit  
zerstreuten rothgelben Flecken.

R 4

G. VIII.



G. VIII. 13. Buccinum  
sinuatum.

Testa turrata anfractibus  
longitudinaliter plicatis, prope  
suturaam attenuatis, labro po-  
stice sinuato.

Mart. Konch. Kab. IV. 155 t. 1464. 1465. f.

Testa turrata. Anfractus circiter  
nouem, longitudinaliter plicati,  
prope suturam complanati. Labrum  
replicatum, postice sinu breui exci-  
sum. Columella replicata. Aper-  
tura, & basis congenerum. Color  
lutescens, epidermide decidua ni-  
gra.

G. VIII. 13. Die Fal-  
tennadel.

Die gehürnte nach der Län-  
ge gefaltene Nadel hat an der  
Nath zusammengedrückte Ge-  
winde, und eine hinten aus-  
geschnittene Schalenlesze.

Die Schale ist gehürmt. Die  
Gewinde, deren ungefehr neun sind,  
der Länge nach gefalten, nächst der  
Nath platt gedrückt. Die Schal-  
enlesze ist erweitert, und hinten  
mit einem kurzen Einschnitte ver-  
sehen. Die Spindel ist übergeschla-  
gen. Die Mündung, und der  
Grund, wie an andern Spindeln  
dieses Geschlechtes. Von gelblicher  
Farbe mit schwarzer abfallender  
Oberhaut.

H. Strombus.

Testa spiralis; apertura  
dilatata, labro ampliato.

H. Die Flügel-Schnecke.

Die schnirkelförmige  
Schale hat eine erweiterte  
Mündung, und ausgebrei-  
tete Schalenlesze.

II. I.



II. I. Digitati, labro in lacinias  
tenuas excunte.

II. I. Gezackte, deren Schalen-  
lesze mit schmalen Zacken versehen  
sind.

H. I. I. Strombus Fusus.

H. I. I. Die Sternma-  
del.

Linn. S. N. Sp. 489.

Belg. Dikke Starre - Pen. Gall. Fuseau étoilé.

Testa turrata laeui, rostro  
subulato, labro dentato.

Die gehürnte glatte Scha-  
le hat einen abtsförmigen Schna-  
bel mit einer gezackten Schalen-  
lesze.

« testa crassa lutescens; apice longitu-  
dinaliter striato, labio incrassato.

« dickschalig gelblich braun, an  
der Spitze nach der Länge ge-  
streift, mit verdickter Spindel-  
lesze.

Bonan. Recr. cl. 3. t. 121.

Liss. Hist. Conch. 1. 4. f. 12. f. II, 18.

Argens. Conch. Pl. 10. f. D.

Klein. Hist. Conch. 1. 4. f. 87.

Seb. Thes. III. t. 56. f. 1. 2.

Knor. Vergn. V. 6. t. 1. f. 7. t. 2. f.

Chemnitz Naturforscher IX. 6. t. 1, 2. f.

Mart. Konch. Kab. II. 158. t. 1495. 1496. f.

« attenuata alba, apice reticula-  
tim striato, rostro elongato.

« Schmal, weiß, an der Spitze  
netzförmig gestreift, mit einem  
verlängerten Schnabel.

R 5

Liss.