

Malakozoologische Blätter

für 1877.

Als Fortsetzung

der

Zeitschrift für Malakozoologie.

Herausgegeben

von

Dr. Louis Pfeiffer

in Cassel.

Vierundzwanzigster Band.

Mit Beiträgen

von

*S. Clessin, W. Dohrn, W. Dunker, O. A. L. Mörch,
L. Pfeiffer.*

Cassel.

Verlag von Theodor Fischer.

1877.

Operculum politum, anguste marginatum; margine antico crasso subliliter granuloso. (M.)

Natica pulchella Pfr. Arch. f. N. G. 1840. p. 254. n. 100?

Natica lacernula d'Orb. Cuba 1842. 2. p. 35. n. 213. t. 17. f. 23—25.

Natica Menkeana Phil. Conch. Cab. t. 15. f. 8.

Natica Menkeana Mke. Zeitschr. 1851. p. 46.

Natica arachnoidea Mke. in litt.

Natica depressa Gray. (quorund.)

var. *a* lineis rufis sparsis.

Hab. Martinique, Cuba (Sagra, Candé) Portorico (Mke.) Nassau, Portorico, Anguilla, N. Providence, Watling (Krebs) St. Thomas, St. Croix (Riise.)

* 443. *Natica* (*Cochlis*) *Sagraiana* d'Orb.

T. globosa, tenui, laevigata, albescente, lineolis fuscis longitudinaliter undulatis, confertim interruptis ornata; spira brevi, obtusa, anfractibus quatuor convexiusculis, ultimo magno, umbilico calloso, antice fissurato, apertura ovali. d'Orb.

Long. 11 mm., diam. 10 mm.

Natica pulchella Pfr. Arch. f. N. G. 1840. VI. 2. p. 254.?) non Risso.)

Natica Sagraiana d'Orb. Cuba 1842. p. 34. n. 212. XVII. f. 20. 22.

Natica Sagraiana (*N. filosa* Phil.) Weink. Mittelm. 2. p. 247.

Hab. Cuba (Sagra) but the locality erroneous according to Recluz J. Conch. III. p. 271. I have not seen any American specimen.

*) *N. pulchella* *T. parva*, subglobosa, nitida, alba, lineolis longitudinalibus undatis picta; spira mammillata; anfr. 3 convexis; umbilico callo nigricante clauso. (Pfr.)

Long. $3\frac{1}{2}$; diam. $3\frac{1}{4}$ lin.

= *N. Sagraiana* d'Orb. teste Philippi.

Von Natica p. 93

Mollusca nonnulla nova maris Japonici.

Auctore

Guilielmo Dunker.

1. *Amycla Burchardti* Dkr.

Testa ovato-conica, striis subtilibus transversis frontem versus sensim crassioribus instructa; anfractus plano-convexi 8—9 sutura distincta sejuncti, ultimus paullulum major; columella glabrata; labrum incrassatum leviter sulcatum, externe turgidulum, subvaricosum; canalis brevis; apex acutiusculus laevigatus; color albidus strigis undulatis vel maculis irregularibus fuscis variegatus. — Long. 15—18 mill.

2. *Cardium Burchardti* Dkr.

Testa oblique ovata, plano-convexa, antice aequaliter arcuata, postice subtruncata, costis 40—42 instructa; costae planae aequales, utrinque crenatae, superne obsolete rugosae paene laeves, costae postremae aream terminantes angustiores crenato-muricatae; sulci angusti et profundi transversim striati; umbones porrecti; cardinis dentes laterales antice in utraque valva crassi ac longi; color externus flavo-albidus, maculis pallide rufis variegatus; epidermis tenuis pallide cornea; latus internum lacteum, sub umbonibus ex parte subroseum; margo pallide rufescens. — Alt. 71 mill. Alt. long. crass. numeris 100, 82, 53 respondet.

3. *Cerithium Kobelti* Dkr.

Testa solida, oblongo-turrita, flavidula, varicosa, anfractibus 8—9 convexis sutura incisa sejunctis, per longitudinem dense plicatis transversimque liratis asperis et nodiferis instructa, ultimo tertiam longitudinis partem fere aequante; apertura ovato-rotunda; canalis brevissimus paullulum resupinatus; labrum incrassatum intus sulcatum. — Long. 23 mill.

adultae 58 mill. longae sunt earumque dimensionis ratio numeris 100, 64, 42 respondet.

26. *Terebra Lischkeana* Dkr.

Plura specimina exstant congruentia. Testa acuta subulata, fascia alba supera, fusca vel coerulescente infera quasi bipartita, anfractibus 17—18 modice convexis, sutura distincta separatis, longitudine costatis instructa; costae laeves; intervalla transversim denseque striata; sulcus infra suturam exilis, in costarum interstitiis punctulis pertusus; apertura oblonga; columella subrecta fusca; canalis brevis; apex purpureo fuscus nitidus. — Specimina maxima plane adulta 35 mill. longa sunt.

27. *Terebra Loebbeckeana* Dkr.

Testa gracilis, longa, alba, fascia pallide fusca lata interrupta cincta, anfractibus circa 30 sutura distincta divisis, parum convexis, oblique costulatis transversimque striatis, subgranosis, superne sulco divisis instructa; apertura angusta; columella parum contorta; canalis subcurvus. — Alt. 75, lat. vix 10 mill.

28. *Trigonella Crossei* Dkr.

Testa ovato-trigona, compressiuscula, inaequilatera, concentrice tenerrimeque striata, marginem versus ventris sulcata, fusco cinereo-vel violacea vel albida, rarius striga lata fusca ab umbonibus ad latus posticum decurrente signata; umbones nitidissimi atro-violacei vel purpurascens; lunula areaque lanceolatae, distincte determinatae, concinne sulcatae; sinus pallii breviculus haud plane perspicuus; color internus plerumque violaceo-fuscus. — Long. 27 mill.

29. *Umbonium Adamsi* Dkr.

Testa depresso-conoidea, nitida, glabra, sub vitro tantum tenerrime striata, albida, lineis confertis undulatis atro-fuscis picta, anfractibus plano-convexis ultimo

fusco instructa; basis planiuscula; callum crassum cinereo album. — Lat. 12, alt. 6 mill.

30. *Vertagus Pfefferi* Dkr.

Testa anguste turrita albida vel flavescens, fasciis cincta, anfractibus convexiusculis transversim costatis et lineatis per longitudinem plicatis granosis et speris instructa, ultimo tertiam longitudinis partem sequante, antice carinato minutimque cancellato; apertura ovato rotunda; labrum paulo incrassatum externe, in Cerithiis solet, varicosum; columella laevis haud plicata; canalis rectus brevissimus paulo resupinatus. — Alt. 22 mill.

31. *Volva Adamsii* Dkr.

Testa angusta extensa utrinque sensim rostrata, nitida, rufescens vel alba, extremitatibus lineis transversim puncturatis sub vitro tantum conspicuis instructa; apertura rectiuscula angusta antice subdilata utrinque subtruncata; labrum incrassatum laeve. — Long. 20 mill. Lat. vix 6 mill.

32. *Volva Carpenteri* Dkr.

Testa gracilis fusiformis antice posticeque attenuata subrecurva carneo-rubens, nitida, striis tenuissimis undulatis sub vitro tantum conspicuis utrinque cincta; labrum glabratum laeve; apertura perangusta subrecta antice latior; columella et labri pars antica sinuosae. — Long. 35 mill. diam. maxima 7 mill.

Ueber die systematische Anordnung der Helicaceen.

Von Dr. L. Pfeiffer.

(Forts. von S. 14.)

Im Anschluss an den früher gegebenen Rahmen der Gattung *Hyalina* oder *Hyalinia* füge ich zunächst