

Act. Soc. Linn. Bordeaux, T. XII, n° 39
1^{er} Mars 1842 : 198-209
(198)

MALACOLOGIE
MUSEUM - PARIS

CONCHYLOGIE.

X. CATALOGUE des Mollusques rares ou nouveaux,
recueillis dans la mer du Sud; par M. le Docteur
ADOLPHE LESSON, et décrits par P. LESSON, membre
correspondant de l'Institut.

I. Genre *COLUMBELLA*. LAMK.

- 1.^o *COLUMBELLA STROMBIFORMIS*, Lam. — Pérou; Acapulco.
Var. Kiéner, pl. 1. fig. 1 a. — Sow. fig. 1.
Jeune [: est abondamment recouverte d'un épais duvet
feutré fauve : on la reconnaît dans cet état à un bourrelet
formant varice dans le milieu de la columelle.
- 2.^o *COLUMBELLA PAYTENSIS*, Less. zool. coq. 1828, pl. 402.
n.^o 163. — Pérou (Callao; Peyta).
C. paytalyda. Duclos; Kiéner, pl. 1. fig. 2.
C. rustica, Sowerby, Cah. IX, fig. 3.
- 3.^o *COLUMBELLA MELRAGRIS*. Duclos; Kiéner, pl. 3. fig. 3.
Acapulco.
- 4.^o *COLUMBELLA SUTURALIS*. Gray; Griff. and Kingd., pl. 41.
fig. 6. — Kiéner, pl. IX. fig. 2. — Pérou.
C. costala. Duclos, monog. pl. 12. fig. 1 et 2.
- 5.^o *COLUMBELLA BICOLOR*. Kiéner, pl. 16, fig. 4.
Très-commune. San-Carlos (Centre-Amér.); Acapulco
(Mexique); Mer du Sud.
- 6.^o *COLUMBELLA AZORA*. Duclos; Kiéner, pl. 6. f. 2.
- 7.^o *COLUMBELLA LANCEOLATA*. Sw.; Kiéner, pl. 33. fig. 7 et 8.
Pérou.

(199)

8.^o *COLUMBELLA CLATHRA*. Less. — Iles Sandwich (Oahou).

Coquille oblongue, conique, renflée au milieu, à sept tours
creusés, convexes au milieu, déprimés aux sutures. Le der-
nier est le plus grand, tous couverts de grosses côtes inter-
rompues, verticales et horizontales, formant entre leurs
points de jonction des trous profonds et dessinant des côtes
saillantes sur le milieu de chaque tour. Ouverture allongée
blanche, lavée de jaunâtre, à columelle marquée de trois
plis, à rebord droit, épais, garni de tubercules. Coloration
générale blanchâtre. — Long. : 30 mill. — Largeur : 16 mill.

9.^o *COLUMBELLA BUCCINOÏDES*. Less. — Acapulco.

Cette espèce, voisine de la *C. lugubris* de Kiéner par les
formes, en est bien distincte par la coloration. Elle est oblon-
gue, turriculée, à spire élevée et conique, pointue, compo-
sée de sept tours, distants, légèrement étagés, déprimés à
leur bord supérieur, tous convexes, marqués par des fosses
verticales, et tous contournés par des côtes saillantes, sépa-
rées par des sillons creux ayant des petits cordons, tandis
que les côtes sont interrompues par les dépressions. Les par-
ties creusées sont rousses; les crêtes des côtes sont noir
vernissé. L'ouverture est étroite, blanc pur. La lèvre droite
est renflée, dilatée, garnie de sillons réguliers. La columelle
est blanche, couverte de points de la même couleur, et ter-
minée de roux. — Long. : 18 millim.

Cette Columbelle vit sur les côtes de l'Amérique Centrale.
Hab. Acapulco (Mex.), et San-Carlos (Centre-Amérique).

10.^o *COLUMBELLA AMPLA*. Less. — Iles Gambier.

Coquille allongée, ovulaire, à spire aigüe, à sept tours, le
dernier ample, dilaté, tous profondément et régulièrement
creusés dans le sens transversal, de sillons séparés par côtes

053220

053221

- 5.° C. LINEATUM, Lamk. — Iles des Amis.
 6.° C. ECHINATUM, Lamk.; Kièn. pl. 3. f. 1. — Taïti.
 Var. *Nivea*.
 7.° C. OHELISCUS, Brug.; Kièn., pl. 5. f. 1. — Taïti.
 8.° C. RUBANUM, Quoy, ast. pl. 54, f. 16.
 Iles Sandwich.
 9.° C. ALUCO, Brug.; Kièn. pl. 6. f. 1. — Acapulco.
 10.° C. LACTEUM, Kièn. pl. 7. fig. 3.

§. 2. — CÉRITHES DES EAUX SAUMATRES : *Potamides*.

- 11.° CERITHIUM EBBINUM, Lamk.; Quoy, Ast. pl. 55. fig. 1,
 2 et 3. — Port-Jackson.
 12.° C. VARICOSUM, Sowerb.; Kièn. pl. 30. fig. 2.
 Realejo (Centre-Amériq.).
 13.° C. MONTAGNEI, D'Orbig. Voy. pl. 63. fig. 3 et 4. —
 Kièn. pl. 30. fig. 1. — Realejo.
 14.° C. NIGRESCENS, Menk., Cat. Mexique : Vera-Cruz. *C.*
eriense. Valen. Kiènc. pl. 24. fig. 1.
 15.° C. HUMBOLDTI, Val.; Kièn. pl. 26. fig. 2. — Acapulco.
 16.° C. OCELLATUM, Brug.; Kièn. pl. 12. fig. 2. — Realejo.

Genre *TEREBRA*, LAM.

- 1.° TEREBRA MACULATA, Lamk.; Lister, pl. 846. fig. 74.
 Taïti; Marquises.
 2.° T. SUBULATA, Lam. — Iles de l'Océanie.
 3.° T. DIMIDIATA, Lam.; Kièner, pl. 2. fig. 2.
 Taïti; Iles Gambier.
 4.° T. CERULESCENS, Lamk. — Taïti.
 Var. *striata*, Less. — Iles Gambier.
 Var. *Taïtensis*, Less. Coq. — Iles Sandwich.
 Var. *Sandwichiensis*, Less.
 5.° T. CORRUGATA, Lamk.; Kièner, pl. 13. fig. 31. — Taïti.

- 6.° T. GEMMULATA, Kièner, pl. 5. fig. 11. — Iles Sandwich.
 7.° T. BABYLONIA, Lamk.; K. pl. 14. fig. 35.
 Taïti, Sandwich.
 8.° T. PERLATA, Less. — Iles Sandwich.

Testâ turrito-subulatâ, aurantiâ; perlis niveis cinctâ; anfractibus convexis, costis longitudinalibus tectis; medianâ lineis crebris intersectis. Aperturâ parvâ; columellâ densâ, rectâ. — Long. : 0,036 millim.

- 9.° T. PERTUSA, Sw. — Taïti.

Terebra striata, Quoy, Ast. pl. 36. fig. 23 et 24.

- 10.° T. ORIZOIDES, Lesson. — Iles Marquises.

Testâ turrito-ovali, levi, albido, aut brunneo, albo cincto; anfractibus convexis; aperturâ ovali, latâ; columellâ densâ, truncatâ, albâ. — Long. : 0,010 mill.

XI. NOTES sur quelques mollusques vares ou nouveaux recueillis dans la Mer du Sud, par M. ADOLPHE LESSON.

Genres : CANCELLARIA, CERITHIUM, TEREBRA, TURBINELLA, et FUSUS.

Genre CANCELLARIA, LAMK.

- 1.° CANCELLARIA CHRYSOSTOMA, Sow, fig. 39. Pérou. — Kièn. pl. 8. fig. 2.

C. multiplicata, Less. Revue zool., 1841, p. 37.

- 2.° C. UMBILICATA, Less. Acapulco.

Voisine, par sa forme, de la *Cancellaria brevis* de Gray; notre espèce appartient au groupe des Cancellaires à bouche triangulaire, dont la *C. tuberculosa* de Sowerby est le type.