

CAROLI LINNÆI

EQUITIS DE STELLA POLARI,
ARCHIATRI REGII, MED. & BOTAN. PROFESS. UPSALÆ;
ACAD. UPSAL. HÆLMIÆ. PETROPOL. BEROL. IMPER.
LOND. MONSIEU. TOLOS. FLORENT. SOC.

SYSTEMA
NATURÆ

PER
REGNA TRIA NATURÆ,
SECUNDUM
CLASSES, ORDINES,
GENERA, SPECIES,
CUM
CHARACTERIBUS, DIFFERENTIIS,
SYNONYMIS, LOCIS.

TOMUS I.

EDITIO DECIMA, REFORMATA.

Cum Privilegio S:æ R:æ M:tis Sveciæ.

HOLMIÆ.

IMPENSIS DIRECT. LAURENTII SALVII,
1758.

virgineu. 407. B. testa subturrita glaberrima erecta, columella truncata sanguinea.

List. conch. t. 15. f. 10.

Pet. gaz. t. 22. f. 7.

Gvalt. test. t. 6. f. A.

Argenv. conch. t. 14. f. N.

Klein. ostr. t. 7. f. 116.

Kratzenf. Regenf. t. 10. f. 40.

Habitat in Africae fluvii.

Teste, quatuor viâ, basi emarginatae sunt, ut ad Helices referri nequeant.

præmor- 408. B. testa ovata lævi atra, spira cariosa, columella
lum. glaberrima.

Habitat in Europa australiore.

Testa magnitudine fere Fabæ, tota atra, rudis; vertex curiosus erosus & quasi præmorjus.

* Angulata (nec antea dicta).

undosum. 409. B. testa ovata: striis transversis elevatis glabris, ventre obtuse quinquangulâri, labro intus striato.

Rumph. mus. t. 29. f. O.

Argenv. conch. t. 12. f. N.

Klein. ostr. t. 3. f. 61.

Habitat in Alta.

undatum. 410. B. testa oblonga rudi transversim furiata: anfractibus curvato-multangulis.

Bonan. recr. 3. t. 189, 190.

List. angl. 156. t. 3. f. 2.

Habitat in O. Europæo.

Simillimum Murici antiquo & despecto, æque rude.

reticula- 411. B. testa ovato- longa transversim striata longitudi-
tum. naliterque rugosâ, apertura dentata.

Gvalt. test. t. 44. f. G, C, E.

Habitat in M. Mediterraneo.

Testa omnibus facile coloribus varians, magnitudine Avellanae. (Animal inhabitans Tritonem esse retulit D. D. Kähler).

scabricu- 412. B. testa ovato-oblonga scabra transversim rugo-
lum. sâ, longitudinaliter striata, columella plicata, labro inæquali.

Gvalt.

Gvalt. test. t. 53. f. D.

Habitat in M. Mediterraneo.

Media inter Volvulus & Buccina; a priori differt columella subperforata, convenit columella plicata; ad hanc imprimis accedit fissura bufose elevata.

nitidu- 413. B. testa ovato-oblonga nitida fasciata, longitudinali-
lum. ter striato-rugosa, labro intus subdentato.

Gvalt. test. t. 52. f. C.

Habitat in M. Mediterraneo.

Testa variat admodum colore & fasciis, sæpe cingulo nigro circumdata. Columella labio minime replicata.

læviga- 414. B. testa ovato-oblonga nitida fusco-striata lævi, aper-
tum. tura edentata unilaterata.

Gvalt. test. t. 52. f. B.

Habitat in M. Mediterraneo.

Testa præcedenti simillima, pallida, obsolete maculata striis obscurioribus; sed differt apertura minime dentata & columella absque labio; Spiræ etiam minime plicatae sunt.

* g * Turrita: lævia subulata.

macula- 415. B. testa turrita, anfractibus lævibus integerrimis.
tum.

Bonan. recr. 3. t. 317.

Rumph. mus. t. 30. f. A. B. D.

Gvalt. test. t. 56. f. B.

Argenv. conch. t. 14. f. A.

Habitat in O. Africae, Asiae.

Testa flavescens maculis purpurascens.

crenula- 416. B. testa turrita, anfractibus margine crenatis.
tum.

Gvalt. test. t. 57. f. L.

Argenv. conch. t. 14. f. T.

Habitat in O. Africano.

hecticū. 417. B. testa turrita, anfractibus margine superiore com-
presso-attenuato.

Gvalt. test. t. 56. f. C.

Habitat in O. Africano.

strigila- 418. B. testa turrita oblique striata.
tum.

Rumph. mus. t. 30. f. H.

Gvalt. test. t. 57. f. O.
Argenv. conch. t. 14. f. R.
Habitat in O. Anatico.

duplica- 419. B. testa turrita, anfractibus bipartitis striatis.
 tum. *Gvalt. test. t. 57. f. N.*
Habitat in O. Indico.

dimidia- 420. B. testa turrita, anfractibus bifidis lævibus.
 tum. *Habitat in O. Africano.*

murinu. 421. B. testa turrita, anfractibus subangulatis, striis tribus
 muricatis.
Gvalt. test. t. 57. f. P.
Habitat ad African.
Testa nigra basi gibba, anfractibus saepe basi albis.

289, STROMBUS. *Animal* Limax.

Testa univalvis, spiralis, latere
 ampliata.

Apertura. Labro sæpius dilata-
 ro, desinens in caulem fini-
 strum.

* Digitati : *labio in laciniis lineares exeunte*

Pes pete- 422. S. testæ labro tetradaetylo palmato digitis angulato,
 cani. fauce lævi.
Bonan. recr. 3. t. 8., 87.
Lill. conch. t. 866. f. min
Gvalt. test. t. 53. f. B. C.
Argenv. conch. t. 17. f. M
Habitat in O. Europæo, Norvegico, Mediterraneo,
Americano.

Chiragra. 423. S. testæ labro pentadaetylo, digitis curvis, cauda
 recurvata.
Bellon. aqu. 422.
Barrel. rar. 327. f. I.
Bonan. recreat. 3. t. 312.
Rumph. mus. t. 35. f. A. B. C.
Gvalt. test. t. 35. f. B. A. & t. 26. f. B.
Habitat ad Bandam Afrix.

424 S.

Scorpius. 424. S. testæ labro heptadaetylo, digitis nodosis: postico
 longillimo.

Rumph. mus. t. 36. f. K.
Gvalt. test. t. 36. f. C.
Argenv. conch. t. 17. f. B.
Habitat in O. Anatico.

Lambis. 425. S. testæ labro heptadaetylo: digitis rectiusculis, fauce lævi.

Barrel. rar. 1326. f. 7.
Bonan. recr. 3. t. 315.
Rumph. mus. t. 35. f. E. F.
Gvalt. test. t. 35. f. C.
t. 36. f. d.
Argenv. conch. t. 17. f. E.
Kratzenst. Regensf. 16. t. 4. f. 45.
Habitat in O. Afrix.

Millepe- 426. S. testæ labro decadaetylo, digitis inflexis, fauce sub-
 da. striata, dorso gibbere compresso.

Bonan. recr. 3. t. 311.
List. conch. t. 868. f. 23 & 869. f. 24.
Rumph. mus. t. 36. f. I.
Argenv. conch. t. 18. f. B.
Habitat in O. Afrix.

* * Lobati.

Lentigi- 427. S. testæ labro antice trilobo incrassato, dorso ver-
 nosus. rucolo coronato, cauda obtusa.

Bonan. recr. 3. f. 300.
Barrel. rar. 1326. f. 4 & 1327. f. 5.
Rumph. mus. t. 37. f. Q.
Gvalt. test. t. 32. f. A.
Argenv. conch. t. 18. f. C.
Habitat in O. Afrix.

Gallus. 428. S. testæ labro dilatato: antice mucronato longissimo,
 dorso coronato, cauda recta.

Bonan. recr. 3. t. 309, 310.
Rumph. mus. t. 37. f. 5.
Gvalt. test. t. 32. f. M.
Habitat .

Auris 429. S. testæ labro antice mucronato, dorso muricato,
 dianæ. cauda erecta acuta.