

PARIS,
IMPRIMERIE DE L. TINTERLIN ET C^e
rue Neuve-des-Bons-Enfants, 3

JOURNAL
DE
CONCHYLOGIE,

PUBLIÉ

Sous la direction de MM. FISCHER et BERNARDI.

TOME VI.

2^e série. — Tome II.



A PARIS,
CHEZ M. BERNARDI, RUE BUFFAULT, 22.

—
Juillet 1857.

« Coquille solide, comprimée, ovale, arrondie en
 « avant, subtronquée en arrière, très-finement sillonnée
 « en travers; lunule lancéolée. A l'intérieur, cette co-
 « quille est d'un blanc jaunâtre, ornée de lignes obliques
 « près de la charnière; de petits angles roux en avant et
 « au milieu; ces dessins, très-fins et très-nombreux, man-
 « quent en arrière. Il existe, en outre, deux rayons inter-
 « rompus de couleur brune, plus larges vers le bord infé-
 « rieur de la coquille. »

Hab. ? (Collection du Journal.)

Observat. Nous dédions cette charmante espèce à
 M. Robillard, amateur zélé de conchyliologie. B.

Description d'espèces nouvelles,

Par M. LOROIS.

TEREBRA *Hupei*. (Pl. XII, fig. 1.)

*Testa pyramidata, albida, maculis rufis, subquadratis, in se-
 rïes transversim dispositis, et punctis purpureis, præsertim
 propè suturam, ornata; longitudinaliter minutè striata, et ob-
 tusè costata; transversim sulcata; infra suturam tuberculosa;
 tuberculis longitudinalibus in medio subcarinatis; columella
 contorta; canali brevi; margine dextro subsinuoso; pagina in-
 terna rufo-bizonata.*

Longueur. . . . 65 millimètres.

Largeur. . . . 16 millimètres.

Hab. ? (Ma Collection.)

Observ. Cette belle espèce, dont nous ne connaissons
 que l'exemplaire qui appartient à notre collection, est
 un peu plus ventrue que la plupart de ses congénères.
 Elle est d'un blanc grisâtre, ornée de taches subquadran-
 gulaires qui ne se prolongent pas jusqu'à la suture. Celle-
 ci est blanche, profonde; le sommet des tours est formé
 par un bourrelet blanc parsemé de taches pourpre, por-
 tant des tubercules irréguliers, et séparé du tour par un
 sillon profond. Columelle et canal recourbés. Intérieur
 de la coquille présentant deux zones transverses brunes,
 sur un fond blanc, 12 à 14 tours de spire.

TEREBRA *Bermonti*. (Pl. XII, fig. 2.)

*Testa subulata, rufo sanguinea; anfractus 16-18 sensim ac-
 crescentes, vix convexi, transversim lirati; longitudinaliter
 costati; costis arcuatis, prominentibus; sutura subcrenata, in-
 fernè funiculo nigerrimo, costis longitudinalibus albis lirato,
 ornata; columella ferè recta; pagina interna albida.*

Longueur. . . . 87 mill. (specim. non integ.)

Largeur. . . . 12 mill.

Habite Taïti. Rapportée par le capitaine de vaisseau
 Bermont.

Observ. Cette espèce est une des plus belles du genre;
 elle est très-allongée, subulée, à tours nombreux et peu
 convexes, rouges, ornés de côtes transversales plus pe-
 tites. Au-dessous de la suture règne un bourrelet d'un
 noir très-foncé, sur lequel se relève l'extrémité blan-
 châtre de chaque côte, qui tranche élégamment par sa
 coloration.

M. Bermont en possède un exemplaire très-adulte.

Il m'a offert celui qui figure dans ma collection et qui
 ne mesure que 30 millim. de longueur. L.

