

PARIS

IMPRIMERIE DE L. TINTERLIN ET C.,

RUE NEUVE-DES-BONS-ENFANTS, 8.

JOURNAL

DE


CONCHYLIOLOGIE

PUBLIÉ

Sous la direction de MM. FISCHER et BERNARDI.

TOME VII.

2^e série. — Tome III.



A PARIS,

CHEZ M. BERNARDI, RUE LEPELLETIER, 19.

—
Juillet 1858.

Description d'une espèce nouvelle,

Par M. LOROIS.

TEREBRA NEBULOSA (Pl. I, fig. 4).

Testa subulata, alba, nebulis pallidissimè fulvis; anfractibus levibus, concavis; sutura supernè nodis et subtis nodulis nimbosis ornata. Columella contorta, canali recurvo, apertura subquadrata.

Long. 46 mill.

Larg. 89 —

Observ. Cette espèce, dont je possède deux exemplaires, est d'un blanc mêlé de nébulosités jaunâtres. Les tours sont très-excavés, lisses; la suture est accompagnée en dessus et en dessous de deux rangées de tubercules; ceux du dessus sont plus gros et plus élevés que ceux de la rangée inférieure. La columelle est contournée, le canal recourbé, l'ouverture subquadrangulaire.

Habitat inconnu.

L.

Description d'espèces nouvelles,

Par M. BERNARDI.

PECTEN SWIFTH (Pl. I et II, fig. 1.)

Testa maxima, utrinque convexa, solidiuscula, nitida, elongata, valva superiore costis nodosis, majoribus 3, minuta; nodis distantibus concentricè dispositis; interstis longitudinaliter ra-

diatis, minutissimè granulatis, costis concentricis 5 gradatim dispositis; valva inferiore vix nodosa, regulariter radiatim sulcata; auriculis valdè inaequaliteribus; suprà nodosis, infra sulcatis.

Long. 105 mill.

Larg. 90 —

« Coquille grande, convexe, assez solide, allongée,
« valve supérieure portant cinq grosses côtes, noueuses;
« nodosités éloignées, disposées sur des lignes concen-
« triques au sommet; interstices striés longitudinalement,
« finement granuleux, sillonnés régulièrement et en
« long; auricules inégales, noueuses en dessus, sillonnées
« en dessous. »

Cette magnifique espèce appartient à la section des PECTEN *corallinus*, *pes-felis*, etc. On compte en dessus 5 grosses côtes noueuses, à interstices radiés longitudinalement et finement granulés. La valve inférieure est à peine noueuse et régulièrement sillonnée. La coloration de la valve supérieure est rougeâtre, elle passe au lilas vers les crochets; la valve inférieure est blanche, teintée çà et là de rose. Intérieur blanc avec quelques reflets jaunâtres.

Hab. la baie Nicolas, dans la Manche de Tartarie. (*Collection du Journal*).

Observ. Ce beau peigne, que nous dédions à M. Swift, amateur zélé de Saint-Thomas, provient du voyage de *la Sibylle*. — Nous n'en connaissons que deux exemplaires: ils ont été pêchés à la ligne.

PECTEN TISSOTI (Pl. I, fig. 2).



Testa ovata, suprà convexa, rubra, et zonis tribus pallidioribus, concentricis, ornata; costis radiantibus 21, rotundis, ferè

	Pages.
PLEUROTOMA <i>Hernæsii</i> , Mayer.	287
— <i>heros</i> , —	81
— <i>mutabilis</i> , —	388
— <i>Seguinii</i> , —	392
— <i>tenella</i> , —	390
TELLINA <i>corbis</i> , Bronn.	389
TURRITELLA <i>acuta</i> , Mayer.	298
VENUS <i>Aglauræ</i> , Brongniart.	88
— <i>Burdigalensis</i> , Mayer.	298
— <i>Vindobonensis</i> , —	86

ERRATA :

Page 133. l. 5. — au lieu de *angulata* var. Born. — lisez —
angulata L. non Born.

Page 137. l. 8. — au lieu de *Amphidona*, *Amphichæna*.



F. Linnæus, del et lith.

Lith. Buquet, fecit.

1. *Pecten Swiftii*, B. — 3. *Helix Martinii*, B.
2. *P. Tissoti*, B. — 4. *Terebra nebulosa*, L.