

Synopsis methodica
MOLLUSCORUM

GENERUM OMNIUM

et

SPECIERUM EARUM,

quae in Museo Menkeano adservantur;

cum

synonymia critica

et

novarum specierum diagnosibus,

auctore

Carolo Theodoro Menke, M. Dre.,

Sereniss. Principis Waldeccens. consiliario et medico aulico,
e numero medicorum dispensandarum aquarum salubrium
Pyrmontanarum muneri praefectorum, societatum complu-
rium literarum publicarum medicinae historiaeque
naturali inservientium sodali.

Editio altera, auctior et emendatior.

PYRMONTI;

sumtibus GEORGI USLAR.

1830.

- Cypraea zikzak, L. (Cypr. undata, Lam. Ann.)
 punctata, L. (Cypr. stercus muscarum, Lam.,
 Cypr. atomaria, Gm.)
 clandestina, L. (Cypr. moniliaris, Lam.)
 asellus, L.
 hirundo, L.
 a. fasciata.
 b. signata.
 c. laxa.
 ursellus, Gm.
 alauda, m. (Martin. Conch. Cab. I. fig. 234. 235.)
 cribraria, L.
 stolidia, L. (Cypr. rubiginosa, Gm.)
 tabescens, Soland. (Cypr. hirundo, c, Lam.,
 Cypr. stolidia, β , Gm.)
 felina, Gm. (Cypr. hirundo, b, Lam., Cypr.
 teres, Gm.)
 erronea, L. (Cypr. olivacea, Lam., Cypr.
 ovum, Gm., Cypr. oblonga, Gm., Cypr.
 spurca, Born.)
 caurica, L.
 obsoleta, subfasciata. (Cypr. derosa, Gm., Cypr.
 corrosa, Meusch.)
 variolaria, Lam.
 erosa, L.
 a. macula in utroque margine.
 b. macula in sinistro tantum margine.
 flaveola, L. (Cypr. miliaris, Gm., Lam.)
 acicularis, Gm. (Cypr. flaveola, Lam.)
 spurca, Gm. (Cypr. sordida, Lam.)
 turdus, Lam.

- Cypraea mus, L.
 juvenilis. (Bulla ferruginosa, Gm.)
 caput serpentis, L.
 adolescens. (Cypr. reticulum, Gm.)
 helvola, L.
 poraria, L., Lam.
 ocellata, L.
 ovulata, Lam.
 lota, L.
 annulus, L.
 moneta, L.
 globulus, L.
 cicercula, L.
 staphylea, L.
 limacina, Lam.
 nucleus, L.
 oniscus, Lam.
 pediculus, L.
 oryza, Lam.
 a. maior, nivea v. rubella.
 b. minor, rosea v. albidia.
 c. minima, fusca.
 coccinella, Lam. (Cypr. costata, Gm.)
 lacrymalis, m.
 a. maior, livida.
 b. minor, carnea. (Cypraea coccinella, b, Lam.)
 Terebellum, Lam. (Terebellum et Seraphs, Montf.)
 subulatum, Lam. (Bulla terebellum, L.)
 Fam. 10. Volutacea. (Columellaires, Lam.)
 Terebra, Br. (Subula et Terebra, Blainv.; Subula
 et Elurna, β , Schum.)

- Terebra maculata*, Lam. (*Buccinum maculatum*, L.)
flammea, Lam.
crenulata, Lam. (*Buccinum crenulatum*, L.)
dimidiata, Lam. (*Buccinum dimidiatum*, L.)
muscaria, Lam.
subulata, Lam. (*Buccinum subulatum*, L.)
duplicata, Lam. (*Buccinum duplicatum*, L.)
monilis, m. (*Buccinum monile*, L.)
babylonia, Lam.
coerulescens, Lam. (*Buccinum terebrale*, Synops. ed. 1.)
cerithina, Lam.
cingulifera, Lam.
myurus, Lam. (*Buccinum strigilatum*, L.)
lanceata, Lam. (*Buccinum lanceatum*, L.)
aciculina, Lam. (*Buccinum cinereum*, Born.)
costata, m. (*Buccinum hastatum*, Gm.)
vittata, Lam. (*Buccinum vittatum*, L.)
 a. *suturis crenatis*.
 b. *suturis simpliciter striatis*.
- Mitra*, Lam. (*Mitra et Conoelix*, Sow.; *Mitra*, *Cylindra et Imbricaria*, Schum.; *Mitra et Turris*, Montf.)
episcopalis, Lam. (*Voluta episcopalis*, L.)
papalis, Lam. (*Voluta papalis*, L.)
 a. *labro incrassato, dentato; columella laminata*.
 b. *labro acuto, edentulo; columella nuda*.
pontificalis, Lam.
cardinalis, Lam. (*Voluta cardinalis*, Gm.)
terebralis, Lam.

- Mitra adusta*, Lam.
 a. *maculis rufo-fuscis*. (*Voluta pertusa*, Gm.)
 b. *maculis nigricantibus*.
scabriuscula, Lam. (*Voluta leucostoma*, Gm., *Vol. scabricula*, L.)
 a. *australis*. (*Voluta Malsburgi*, Grandid.)
 b. *indica*.
granatina, Lam.
crenifera, Lam.
plicaria, Lam. (*Voluta plicaria*, L.)
corrugata, Lam.
vulpecula, Lam. (*Voluta vulpecula*, L.)
caffra, Lam. (*Voluta caffra*, L.)
stigmataria, Lam.
filosa, Lam. (*Voluta filosa*, Born.)
lutescens, Lam.
striatula, Lam.
cornea, Lam.
dactylus, Lam. (*Voluta dactylus*, L.)
paupercula, Lam. (*Voluta paupercula*, L.)
 a. *maior, ovato-oblonga*.
 b. *minor, ovato-elliptica*.
cucumerina, Lam.
patriarchalis, Lam. (*Voluta patriarchalis*, Gm.)
torulosa, Lam.
retusa, Lam.
ebena, Lam.
Defrancii, Payr.
Savignyi, Payr.
filaris, m. (*Voluta filaris*, L.)