

carinatus, non descendens, basi convexus; apertura perobliqua, triangularis; columella brevis, arcuata, callum crassum, album, circumscriptum emittens; perist. subincrassatum, album, margine supero late expanso-reflexo, basali leviter arcuato, late reflexo. — Operc.? — Diam. maj.  $21\frac{1}{2}$ , min. 18, alt. 10 mill. (Mus. Cuming.)

*Helicina Moreletiana* Pfr. in Chemn. ed. II. N. 93. t.

10. f. 1. 2. (ined.)

Habitat . . . ?

#### 4. *Helicina biangulata* Pfr.

T. subturbinato-depressa, solidiuscula, spiraliter impresso-striata, parum nitida, fulvido-rubella; spira subconvexa, vertice acuminata; anfr. 5 subplani, ultimus peripheria angulatus, antice angulo secundo instructus, basi convexiusculus, confertius spiraliter striatus; apertura obliqua, semiovalis; columella brevis, extrorsum arcuata, subdentata, callum emittens album, circumscriptum; perist. latiusculum, expansum, album. — Operc.? — Diam. maj. 11, min. 9, alt. 6 mill. (Coll.)

*Helicina biangulata* Pfr. in Chemn. ed. II. N. 100. t. 10.

f. 34. 35. (ined.)

Habitat in Brasilia?

#### 5. *Helicina Tamsiana* Pfr.

T. subgloboso-turbinata, tenuis, sub lente spiraliter minute striata, nitidula, pellucida, corneo-rubella; spira conoidea, acutiuscula; anfr. 5 convexiusculi, ultimus obsolete angulatus, basi planiusculus; apertura obliqua, late semiovalis; columella brevis, filaris, subrecedens, callum emittens tenuem, album, diffusum; perist. tenue, album, angulatim patens, margine dextro dilatato, basali versus columellam angustato. — Operc.? — Diam. maj. 9, min.  $7\frac{3}{4}$ , alt. 6 mill. (Coll.)

*Helicina Tamsiana* Pfr. in Chemn. ed. II. N. 95. t. 10.

f. 9—11.

Habitat Venezuela.

(April, 1851.)

Druck und Verlag von Theodor Fischer in Cassel.

## Zeitschrift

für

# Malakozoologie.

Herausgegeben

von

Dr. **Karl Theodor Menke**

in Pyrmont

und

Dr. **Louis Pfeiffer**

in Cassel.

Achter Jahrgang.

1851.

Mit Beiträgen von R. A. Philippi, A. Schmidt und den Herausgebern.

Cassel.

Druck und Verlag von Theodor Fischer.

1852.