

MANUELS OUEST-AFRICAINS. VOL. III

Mollusques testacés marins  
de la  
Côte occidentale d'Afrique

PAR

MAURICE NICKLÈS

464 figures



PAUL LECHEVALIER

ÉDITEUR



17, RUE DE TOURNON - PARIS-VI

1950

**TEREBRA** Bruguière 1792

Coquille turriculée, à tours presque plans, souvent très nombreux ; la plupart du temps solide et brillante. Ouverture très petite, sinueuse à la base ; columelle munie d'une ride spirale épaissie. Opercule pointu vers le bas, à nucleus terminal.

Environ 200 espèces des mers tropicales, dont certaines d'une grande beauté ; une douzaine sur la Côte occidentale d'Afrique. Animaux vivant dans le sable à faible profondeur.



**271. Terebra senegalensis** Lamarck (= *le Favat* Adanson). Coquille de 70 à 110 mm., présentant des tours marqués d'un sillon spiral situé sous la suture et à quelque distance de celle-ci ; plis de croissance bien visibles. Coloration cornée avec flammules brunes, irrégulièrement réparties.

Connue à l'état fossile dans le Miocène d'Europe, cette espèce vit du Cap Blanc à l'Angola ; commune au Sénégal.

**272. Terebra micans** Hinds (= *l'Arvan* Adanson). Coquille de 25 à 30 mm., très brillante, ornée seulement de très fines rides transversales, bien visibles sur la moitié inférieure des tours. Coloration blanche, unie ou marquée de bandes spirales brunes et fauves.

Connue de la Mauritanie à l'Angola, cette espèce peut souvent s'observer vivante, par centaines, sur le sable de la côte atlantique des environs de Dakar, à marée descendante.

Adanson). Coquille  
nier tour arrondi à  
fait typique, con-  
au plus ou moins  
ond jaunâtre de la  
pèce a été signalée

de 45 à 70 mm.,  
anche, irrégulière-  
Méditerranéen (couches  
dans la région de

à 50 mm., à spire  
ornée consistant en  
lesquelles se déta-  
points et de tirets


également sur la  
française.

à 45 mm., à spire  
Coloration blanche  
résistante.



**273. *Terebra lepida*** Hinds. Coquille de 20 à 30 mm., ornée de rides transversales peu serrées, s'atténuant sous la suture. Coloration cornée marquée de taches brun foncé, disposées notamment en haut et en bas de chaque tour, entre les rides.

Connue de Dakar au Mossamédès.



**274. *Terebra corrugata*** Lamarck, var. ***bitorquata*** Deshayes. Coquille de 40 à 70 mm., de forme très allongée et présentant des tours extrêmement nombreux, ornés à la partie supérieure, de deux cordons spiraux régulièrement granuleux de force inégale, le supérieur étant plus fort que l'autre. Coloration cornée, marquée de taches brunes irrégulières.

Connue par quelques exemplaires récoltés dans la région de Dakar.

#### **ACTAEON** Montfort 1810

Coquille petite ou moyenne, à spire moyennement élevée, présentant des tours embryonnaires sénestres; dernier tour grand, ovoïde; ouverture entière, rétrécie vers le haut, arrondie à la base; columelle présentant la plupart du temps un pli à la base. Opercule corné.

Environ 30 espèces de toutes les mers, vivant à faible profondeur; 3 sur la Côte occidentale d'Afrique.

**275. *Actaeon tornatilis*** Linné. Coquille de 15 à 25 mm., ovoïde, ornée de fines stries spirales et présentant un fort pli à la base