

10 *gibbosa* Ross 11 *rubensis* Pl. (La-  
 12 *gibbosa* Müll. 13 *tenucostata* Dkr.  
 14 *gibbosa* Müll. 15 *gibbosa* Müll. 16 *Helix* inter-  
 17 *scripta* Binn. 18 *scripta* Binn. 19 *scripta* Binn.  
 20 *scripta* Binn. 21 *scripta* Binn. 22 *scripta* Binn.  
 23 *scripta* Binn. 24 *scripta* Binn. 25 *scripta* Binn.  
 26 *scripta* Binn. 27 *scripta* Binn. 28 *scripta* Binn.  
 29 *scripta* Binn. 30 *scripta* Binn. 31 *scripta* Binn.  
 32 *scripta* Binn. 33 *scripta* Binn. 34 *scripta* Binn.  
 35 *scripta* Binn. 36 *scripta* Binn. 37 *scripta* Binn.  
 38 *scripta* Binn. 39 *scripta* Binn. 40 *scripta* Binn.  
 41 *scripta* Binn. 42 *scripta* Binn. 43 *scripta* Binn.  
 44 *scripta* Binn. 45 *scripta* Binn. 46 *scripta* Binn.  
 47 *scripta* Binn. 48 *scripta* Binn. 49 *scripta* Binn.  
 50 *scripta* Binn. 51 *scripta* Binn. 52 *scripta* Binn.  
 53 *scripta* Binn. 54 *scripta* Binn. 55 *scripta* Binn.  
 56 *scripta* Binn. 57 *scripta* Binn. 58 *scripta* Binn.  
 59 *scripta* Binn. 60 *scripta* Binn. 61 *scripta* Binn.  
 62 *scripta* Binn. 63 *scripta* Binn. 64 *scripta* Binn.  
 65 *scripta* Binn. 66 *scripta* Binn. 67 *scripta* Binn.  
 68 *scripta* Binn. 69 *scripta* Binn. 70 *scripta* Binn.  
 71 *scripta* Binn. 72 *scripta* Binn. 73 *scripta* Binn.  
 74 *scripta* Binn. 75 *scripta* Binn. 76 *scripta* Binn.  
 77 *scripta* Binn. 78 *scripta* Binn. 79 *scripta* Binn.  
 80 *scripta* Binn. 81 *scripta* Binn. 82 *scripta* Binn.  
 83 *scripta* Binn. 84 *scripta* Binn. 85 *scripta* Binn.  
 86 *scripta* Binn. 87 *scripta* Binn. 88 *scripta* Binn.  
 89 *scripta* Binn. 90 *scripta* Binn. 91 *scripta* Binn.  
 92 *scripta* Binn. 93 *scripta* Binn. 94 *scripta* Binn.  
 95 *scripta* Binn. 96 *scripta* Binn. 97 *scripta* Binn.  
 98 *scripta* Binn. 99 *scripta* Binn. 100 *scripta* Binn.

Zusammenge stellt, Pyrmont, im December.  
 Hannover, im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung.

# Zeitschrift

für

# Malakozoologie.

Herausgegeben

von

**Dr. Karl Theodor Menke**

und

**Dr. Louis Pfeiffer.**

**Dritter Jahrgang**

**1846.**

Mit Beiträgen von *W. Dunker, J. Jonas, R. A. Philippi, E. A. Rossmässler, F. A. Schmidt, J. v. Voith* und den Herausgebern.

**Cassel.**

Druck und Verlag von Theodor Fischer.

**1846.**

10. *C. plicatulum* Pfr. — T. subperforata, oblongo-turrita, subdecollata, tenuis, longitudinaliter confertim plicatula, diaphana, corneo-albida, fasciis latiusculis castaneis, articulatis ornata; anfr. 6 convexi, regulariter accrescentes, ultimus breviter solutus, rotundatus, circa perforationem obsoletam spiraliter sulcatus; apertura verticalis, oblique elliptica; perist. simplex, vix expansiusculum, superne angulatum. — Long. 21, diam. 10 mill.

Habitat . . . ? (Coll. v. d. Busch).

### Diagnosen neuer Conchylien.

Vom Dr. W. Dunker.

1. *Ostrea Cumingiana* Dkr. — O. socialis testa crassa inaequalvalvi ovato-obliqua vel subrotundata, sordido alba, intus alba et atro purpurea, plicis radiantibus validis obtusis rugosis et lamelloso-imbricatis instructa; valva superiore subconvexa seu plano concava, inferiore valde concava, umbone sinistrorsum inclinato; impressione musculari magna oblique rotundato-ovata, margine palliari valvae superioris subgranosa. Alt. 3<sup>u</sup> 9<sup>u</sup>, long. 3<sup>u</sup> 2<sup>u</sup>, crass. 1<sup>u</sup> 10<sup>u</sup>.

Patria ignota.

2. *Tellina Mejeri* Dkr. — T. testa rotundato-ovata, tenui, aequalvalvi, inaequilatera, plano-convexa, alba, nitida, concentricè striata et sulcata, antice producta orbiculari, postice brevior subattenuata rotundata; margine cardinali antica excavata, postica subarcuata; umbonibus parvulis subacutis antrorsum inclinatiss, plica magna pone illos ad baseos posticam partem subsinuatam decurrente; lunula angustissime cordiformi; area lanceolata; ligamento lineari, longo, immerso. — Dentes cardinales in valva utraque duo, anticus sinistrae et posticus dextrae bifidus; dentes laterales nulli.

Long. 1<sup>u</sup> 11<sup>u</sup>. Long. alt. crass. = 100 : 78 : 30.

Patria: Indiae orientales.

Diese beiden Arten werden in den nächsten Hefen von Philippi's Abbildungen etc. abgebildet werden.

Druck und Verlag von Theodor Fischer in Cassel.

# Zeitschrift für Malakozoologie.

Herausgegeben

von

**Karl Theodor Menke, M. D.**

und

**Dr. Louis Pfeiffer.**

1846.

(Es erscheint monatlich ein Bogen.)

April.

## Diagnosen neuer Conchylien-Arten,

vom Dr. R. A. Philippi.

(Fortsetzung.)

### 14. *Acmaea nisoria* Ph.

*A. testa solida, suborbiculari, elevato-conica, longitudinaliter obscure striato-costata, albida, lineis, flammulis, punctisque fuscis subtessellata; vertice ad  $\frac{2}{3}$  longitudinis sito; pagina interna alba, fornice saepius fusca; margine fusco-punctato. Long. 7 $\frac{1}{2}$ <sup>u</sup>; lat. 7<sup>u</sup>; altit. 3<sup>u</sup>.*

Patria: Chili.

Die vertieften Längslinien sind unregelmässig, bisweilen ist eine schwache Andeutung von etwa 16 Längsrippen, also ähnlich wie bei *A. variabilis* (Lottia) Sow. (= *Patella zebрина* d'Orb. = *P. coquimbensis* coll.) oder wie bei *A. punctatissima*. Auf weisslichem Grunde verlaufen rothbraune unterbrochene Längslinien, Flammen und Punkte, welche ein mehr oder weniger dichtes Netzwerk hervorbringen, und die Zwischenräume sind oft noch mit milchweissen Strichelchen bezeichnet. Ein Exemplar hat fast ganz die Färbung der *A. punctatissima*. Der fast kreisrunde Umriss, die Höhe und Dicke der Schale unterscheiden diese Art leicht.

### 15. *Acmaea exilis* Ph.

*A. testa oblongo-elliptica, convexa, alba, laevi, radius*

Diese Art hat fast ganz die Gestalt von *Monodonta carchedonius* Lamk., unterscheidet sich aber, selbst abgesehen von der gezähnten Peripherie, leicht durch die stark hervorstehenden Knoten auf der Kante der letzten Windung, die sich über zwei Furchen erstrecken, so wie durch die schwächeren Knoten an der Naht. Der Ausschnitt unterhalb des Zahnes der Columella ist wie bei *M. modulus*, und weit tiefer als bei *M. carchedonius*; die Nabelspalte ist enger als bei der letzteren Art.

20. *Buccinum nucleolus* Ph.

*B. testa minima, ovato-conica, longitudinaliter plicata, transversim rugosa, alba, cingulo rufo superne ad suturas, alioque in basi picta; spira conica, aperturam ovatam superante; labro extus marginato, intus dentibus decem munito; labio haud extenso. Alt. 3<sup>'''</sup>; diam. 2<sup>'''</sup>.*

*Patria: Mazatlan.*

Ein *Buccinum prismaticum* im Kleinen. Zwölf bis dreizehn wellenförmige Rippen von der Breite der Zwischenräume werden auf der vorletzten Windung von fünf, auf der letzten von etwa 14 Querrunzeln durchschnitten. Die ersten zwei, und die letzten zwei Querrunzeln sind braunroth; auch zeigt sich ein rostbrauner Fleck am obern Winkel der Mundöffnung und oft nach aussen auf der Mitte der Aussenlippe ein andrer.

21. *Buccinum avena* Ph.

*B. testa parva, oblonga, subsusiformi, laevissima, ad basin striolata, nigro-fusca, linea pallida medium anfractus ultimi cingente; spira aperturam aequante; labro simplice superne paullo sinuato, medio recto; columella nodulosa. Alt. 3<sup>'''</sup>; diam. 1½<sup>'''</sup>.*

*Patria: Chili.*

Wäre die Aussenlippe innen verdickt, und mit Zähnen besetzt, so würde man diese Art wohl zu *Columbella* bringen. Der Rand der Aussenlippe ist schwarz.

22. *Buccinum secalinum* Ph.

*B. testa parva, subulata, confertim transverse striata, fusca; spira aperturam superante; anfractibus plaiusculis; apertura oblonga; labro simplice, superne paullo sinuato, medio recto; columella arcuata, laevissima. Alt. 3¼<sup>'''</sup>; diam. 1½<sup>'''</sup>.*

*Patria: Chili.*

Diese Art kommt auch milchweiss vor, auch besitze ich ein monströses Exemplar, wo die Windungen aufgetrieben, und in der Mitte kantig sind.

23. *Terebra fulgurata* Ph.

*T. testa subulato-turrita, longitudinaliter multangula, laevissima, albida, lineis rufis in ziczac flexis picta; fascia fusca infra suturam translucente; suturis obsoletis; apertura fere tertiam longitudinis partem aequante. Alt. 6½<sup>'''</sup>; diam. 1¾<sup>'''</sup>.*

*Patria: Mazatlan.*

Nahe mit *T. aciculata* (*Buccinum*) Lamk. verwandt, aber durch zwölf, oder mehr, oft über sämtliche Windungen herablaufende Längskanten, ganz ebene Windungen und undeutliche Näthe sehr ausgezeichnet.

24. *Columbella pallida* Ph.

*C. testa oblongo-fusiformi, transversim sulcata, albida, fascia e maculis rufis confluentibus picta; spira aperturam subsuperante; apertura oblonga, violacescente; labro fere rectilineo, intus denticulis circa 6 munito. Alt. 4½<sup>'''</sup>; diam. 2<sup>'''</sup>.*

*Patria: Mazatlan.*

In der Gestalt stimmt diese Art mit *C. azora* Duclos, Kiener p. 17. t. 6. fig. 2 überein. Die Spira ist länger als die Mündung und besteht aus mehr als sechs Windungen, welche schwach gewölbt sind. Auf der vorletzten zähle ich sechs, auf der letzten 14 Querlinien oder Furchen; auf den obersten Windungen werden dieselben