

J. B. 6400

ANNALI

DEL

MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE

DI GENOVA

PUBBLICATI PER CURA

DI

G. PORIA E R. GESTRO

—
VOLUME VIII. - 1876
—



GENOVA

TIPOGRAFIA DEL R. ISTITUTO SORDO-MUTI

1876

(*Ghiliani*) (V. Deutsche Entom.

rusa (*Doria*), due esemplari, una di cui è la femmina. Descrizione del Küster pel capo e torace, per le varie disuguaglianze, per le varie sensibili e per gli articoli e dilatati; probabilmente è una delle forme sensibili della sua struttura colta dal *lanipes*.

(*Ghiliani*), Lerma (*Filippa*), Lucca (*Doria*).

li Busalla (*Gestro*) per robustezza di tegumentazione fitta e corrugata, come per le due elitre ha più profonde le due elitre e smussati gli angoli posteriori; l'intervallo delle elitre è anche più largo.

Piemonte (*Ghiliani* e *Fea*).

): varia un esemplare ♂ simile a quello di cui si è detto, ma con la sinuosità laterale del torace e più ridotta l'appendice terminale.

(*Baudi*).

Genova, Spezia (*Doria* e *Ferrari*).

Alpi marittime (*Fairmaire*), Alpi marittime.

(*Fea*), Stazzano (*Ferrari*).

), Spezia (*Kerim*), Bibbiena.

rietà di più piccola statura che il maschio, più annerito, bruni i piedi, torace meno stretto in profilo, elitre un po' più arrotondati, leggerissima la metà; pel corpo un po' più

convesso s'avvicina d'aspetto all'*H. Faldermanni*. Una femmina, trovata in Corsica sett. (*Doria*).

H. Genei Gené. Sardegna (*Ghiliani*), id. Talana e Gennargentu (*Gestro*).

H. planipennis Küst. Alpi maritt. (*Ghiliani*), Toscana e Roma (*Baudi*), Napoli (*Emery*).

H. quisquilius Fabr. Muls. Lombardia, Desenzano (*Baudi*).

H. striatus Fourcr. Francia (*Baudi*).

H. brevis Küst. Armenia russa (*Doria*).

H. convexus Comol. Alpi (*Fea*), Gressoney e M. Barone (*Doria*), Valdobbia (*Carestia* e *Kerim*), Graglia (*Gnecco*), Valormazza (*Ghiliani*).

Var. *alpinus* Heer, Alpi elvetiche (*Heer*). Un maschio d'un colore più intenso, un po' più stretto di corpo, col torace relativamente alle elitre più largo, meno sinuato ai lati prima degli angoli posteriori, più largamente spianato sui lati del disco, a punteggiatura più fina; elitre dietro gli omeri lateralmente un po' compresse, un po' rilevate, quasi callose all'unione del settimo intervallo col terzo.

H. parvulus Küst. Andalusia (*Ghiliani* e *Baudi*).

H. pallidus Curtis, Francia mer. (*Ghiliani* e *Baudi*).

H. (Eubaeus) Mimonti Boield. Olimpo in Tessaglia (*Dieck*).

Nephodes villiger Rosenh. Spagna (*Baudi*).

N. metallescens Küst. Sardegna, Porto Corallo, Sarrabus, Talana (*Gestro*), Corsica (*Baudi*).

Appendice alla parte seconda, a pag. 696 del Vol. VII, 1875, degli Annali del Museo Civico di Genova.

Nella Tribù dei Pedinini al genere *Dendarus* nel sottogenere *Pandarinus* dopo il *D. piceus* aggiungasi:

Dendarus (Pandarinus) armeniacus n. sp. *Oblongo-ovatus, nitidus, niger, capite antice confertim, fronte thoraceque subtiliter, parum dense punctatis, hoc anterius convexo, lateribus subtiliter*

Harpa conoidalis Lamk. var. δ . Reeve Conch. Icon., tav. III, f. 7, c.

Hab. Ansus, Is. Jobi (Beccari).

Harpa ventricosa Lamk. Reeve Conch. Icon., tav. II, f. 4, a, d.

Hab. Baia di Geelwinck (Bruijn).

Harpa nobilis Martini Reeve Conch. Icon., tav. I, f. 1.

Hab. Baia di Geelwinck (Bruijn).

Dolium pomum L. *Cassis labrosa* Martini. Reeve Conch. Icon., tav. VI, f. 6.

Hab. Ansus, Is. Jobi (Beccari).

Terebra maculata L. Reeve Conch. Icon., tav. I, f. 4.

Hab. Ansus, Is. Jobi (Beccari).

Terebra varia Meuschen. *Buccinum ornatum* Martyn; *Epitonium guttatum* Bolten; *Terebra oculata* Lamk. Reeve Conch. Icon., tav. V, f. 18.

Hab. Ansus, Is. Jobi (Beccari).

Terebra muscaria L. *Vertagus areolatus* Link. Reeve Conch. Icon., tav. III, f. 9.

Hab. Ansus, Is. Jobi (Beccari).

Terebra muscaria L. var. *callichloros* Tapp. Can. Quoy e Gaim. Voy. de l'Astr.

T. muscaria testa minore angustiore vivide picta et maculata anfractibus apicalibus brevius longitudinaliter costellati.

Hab. Mansinam (D'Albertis).

Terebra subulata L. *Buccinum varium* Martyn. Reeve Conch. Icon., tav. VI, f. 22.

Hab. Ansus, Is. Jobi (Beccari).

Conus marmoreus L. Kiener Icon. des Coq., tav. II, f. 1.

Hab. Ansus, Is. Jobi (Beccari).

Conus (Lithoconus) Virgo L. Reeve Conch. Icon. tav. XXI, f. 119.

Hab. Ansus, Is. Jobi (Beccari).

Conus litteratus L. Reeve
Hab. Ansus, Is. Jobi (Beccari).

Conus (Lithoconus) millepunctatus L.
Reeve Conch. Icon., tav. XXXII, f. 178.

Hab. Ansus, Is. Jobi (Beccari).

Conus (Cheiloconus) magus L.
Reeve Conch. Icon., tav. XXXV, f. 190.

Hab. Ansus, Is. Jobi (Beccari).

Conus (Cheiloconus) striatus L.

Hab. Ansus, Is. Jobi (Beccari).

Conus (Cylinder) textile L. Reeve
Conch. Icon., tav. XXXIX, f. 209.

Hab. Ansus, Is. Jobi (Beccari).

Conus (Cylinder) omaria B.
Reeve Conch. Icon., tav. LXXXIX, f. 1, a.

Hab. Ansus, Is. Jobi (Beccari).

Strombus lentiginosus L. Reeve
Conch. Icon., tav. LXXXIX, f. 209.

Hab. Ansus, Is. Jobi (Beccari).

Strombus (Canarium) luhuanus L.
Reeve Conch. Icon., tav. LXXXIX, f. 54.

Hab. Ansus, Is. Jobi (Beccari).

Strombus (Canarium) gibbatus L.
Reeve Conch. Icon., tav. LXXXIX, f. 54.

Hab. Ansus, Is. Jobi (Beccari).

Var. *ore roseo et albo*,
Reeve Conch. Icon., tav. LXXXVII, f. 797, 798.

Hab. Mansinam (D'Albertis).

Var. *ore roseo, columella
et maculato*.

Hab. Mansinam (D'Albertis).

Pterocera millipeda L. Reeve
Conch. Icon., tav. LXXXIX, f. 209.

Hab. Ansus, Is. Jobi (Beccari).