

= VARIEGATA (152)

= VARIEGATA GRAY 1834

SEE HOLOTYPE AT VARIEGATA NK 77

8. *africana*, *Terebra* - GRAY in GRIFFITH & PIDGEON, 1834, Moll. Reg. Anim. Cuv., pl. 23, fig. 5. Hab. ? Coll. J. E. Gray. Size of figure: 68.0 mm. Holotype no. 74.10.12.12: 67.4 mm (marked x inside aperture); syntype is 61.6 mm. = *Terebra variegata* GRAY, 1834.

C 69

TEREBRA AFRICANA, Gray, Griff. Anim. Kingd. pl. 23. f. 5.
Double emploi du *Terebra variegata*, Gray. DESH 1259 p 316.

Africana (*Terebra*). Gray. Griffiths' ed. Cuv., t. 23, f. 5.
= *T. variegata*, Gray, 15
TUKTON 1865

10. **VIS D'AFRIQUE.** *Terebra africana*, GRAY. γ^{111}

(Collect. MASS.) GRIFFITH, Règ. anim., pl. 23, fig. 5.

Pl. II, fig. 3.


T. testâ turrito-subulata, fulvo-cinereâ aut cœruleâ, longitudinaliter fusco-maculatâ, anfractibus transversim sulcatis, supernè tuberculis, albo et fusco-maculatis.

Coquille allongée, subulée, turriculée, conique, composée de tours nombreux, aplatis, munis à leur partie supérieure d'un bourrelet peu saillant, divisé en crénelures obtuses ou en nodosités qui couronnent les tours. La suture est simple et peu profonde; la superficie des tours est marquée de sillons transverses, également écartés, au nombre de quatre sur la convexité des tours, excepté sur le dernier où ils sont plus considérables. L'ouverture est petite, oblongue, atténuée aux extrémités, colorée de jaunâtre avec deux larges bandes brunes qui se prolongent jusqu'au fond; le bord droit est mince et tranchant, sinueux vers le milieu de sa longueur; la columelle est luisante, fortement tordue, garnie vers le milieu de l'ouverture d'un gros pli qui tourne dans la cavité, et qui se renverse à la base vers le dos de la coquille. La couleur de cette espèce est un fauve mêlé de teintes cendrées ou bleuâtres, orné de taches longitudinales brunes; d'autres taches blanches et brunes plus ou moins arrondies sont distribuées sur le bourrelet des tubercules; une bande roussâtre traverse le milieu de la convexité du dernier tour.

Long. 2 pouc. 1/2.

Habite

Cette coquille, dont je ne connais que très-peu d'individus, se reconnaît facilement à la coloration et à la distribution des tubercules qui se continuent au-dessous de la suture. Un individu semblable a été figuré par M. Griffith, dans la traduction anglaise du *Règne animal* de Cuvier. KN 1238-35 p 14



BAAT 87 FIG. 152. Holotype of *Terebra africana* Gray, 1834 (see sp. 152, *Terebra variegata* Gray, 1834).