

3. *Terebra arabella* Thiele, 1925

(figure : 4)

X 15

C'est une petite espèce, rare, figurée pour la première fois de Polynésie française. Sa couleur est gris verdâtre uniforme, ce qui la rapproche de *T. nitida* Hinds ; mais la présente espèce est toujours la plus petite. Les sillons spiraux sont au nombre de 2 ou 3 et sont mieux marqués chez *T. arabella*, par rapport à *T. nitida*, tandis que les rides axiales s'étendent jusqu'au bord inférieur du dernier tour. Taille moyenne adulte : 1 cm.




Figure 4 : *Terebra arabella* Thiele, 1925
Baie de Matavaï (Tahiti) - 18,5 mm.
(Photo G. RICHARD)

X 15

20. *arabella*, *Terebra* - THIELE. 1925, Wiss. Erg. Deut. Tief. Exp. Valdiv., 17: 312, plt. 29, fig. 24. Hab. Sumatra. Ex coll. Berlin Museum. Three paratypes no. 1948.12.10.5-7.

ARABELLA
Thiele 1925

C 69

(V) (90)

90. *Terebra arabella* Thiele, 1925

(Pl. 24, fig. 90)

1925 *Terebra arabella* Thiele, Wiss. Ergeb. Tief. Exped. "Valdivia" 17(2):346, pl. 29, fig. 24; 1984 Trondle, Xenophora 15:8, fig. 4; 1984 Salvat & Rives, Shells of Tahiti, p. 136, fig. lower.


Description: Shell to 22 mm; color shiny tan to brown with lighter axial ribs; outline of whorls convex; protoconch 4 conical whorls; subsutural band marked by moderately deep grooves between ribs; axial ribs well developed, widely-spaced, curved, extending from suture to suture, the same width as interspaces, each rib contiguous with an interspace on preceding whorl; spiral grooves fine, 4 or 5 per whorl; aperture semi-elongate; columella slightly recurved, with moderate parietal callus.

Type locality: "Padang" Sumatra, Indonesia.

Distribution: From Indonesia to French Polynesia.

Type: Lectotype MNHUB; 10.7 mm.

Discussion: This shiny species may be recognized by its arcuate ribs which seem to fall exactly between the ribs of the preceding whorl. For comparison refer to *T. isabella* (89).B-30-196



90, *T. arabella* Thiele. Same Institution; 10.7 mm.

Terebra arabella n. sp.

(Tafel 29 Figur 24.)

Mehrere Schalen haben ähnliche Färbung wie die vorige, doch ist das Mittelband breiter, so daß es von dem dunkleren unteren Teil der letzten Windung nur durch ein nicht scharf abgesetztes helleres Band getrennt wird, die Windungen sind deutlich niedriger, die letzte unten ziemlich schnell verjüngt, die Rippen treten unter der Naht etwas eckig vor. Embryonalschale spitz, mit 4½ Windungen, die folgenden 11 Windungen ziemlich breit und niedrig, mit kräftigen, kantigen, unter der Naht abgerundet eckigen Rippen und wenigen Spirallinien, deren oberste am stärksten ist, letzte Windung unten abgerundet kantig, schnell zum Siphonalfortsatz verschmälert, Mündungsschwiele kräftig, die Rippen am Ende etwas dichter, nicht verkürzt; Mündung klein, oben mäßig spitz. Höhe der abgebildeten Schale 12 mm, Durchmesser 2,5 mm.



24

THIELE 1925 p 346