

BERMONTI

LOROIS 1857 (98)

= SUCCINCTA

TEREBRA *Bermonti*. (Pl. XII, fig. 2.)

Testa subulata, rufa sanguinea; anfractus 16-18 sensim accrescentes, vix convexi, transversim lirati; longitudinaliter costati; costis arcuatis, prominentibus; sutura subcrenata, infernè funiculo nigerrimo, costis longitudinalibus albis lirato, ornata; columella ferè recta; pagina interna albida.

Longueur. . . . 87 mill. (specim. non integ.)

Largeur: 12 mill.

Habite Taïti. Rapportée par le capitaine de vaisseau Bermont.

Observ. Cette espèce est une des plus belles du genre; elle est très-allongée, subulée, à tours nombreux et peu convexes, rouges, ornés de côtes transversales plus petites. Au-dessous de la suture règne un bourrelet d'un noir très-foncé, sur lequel se relève l'extrémité blanchâtre de chaque côte, qui tranche élégamment par sa coloration.

M. Bermont en possède un exemplaire très-adulte.

Il m'a offert celui qui figure dans ma collection et qui ne mesure que 30 millim. de longueur. L.

LOROIS 1857 p 389



THE FIGURE DOES NOT MATCH THE DESCRIPTION !!!



T. Bermontii Lorois = pertusa

130. TEREBRA BERMONTI, Lorois.
Terebra bermonti, Lorois, Journ. de Conch. 1857, p. 389, pl. 12.
f. 2. DESH 1857 p 300
Hab. Taïti.

7. *Terebra Bermontii*, Lorois (= *pertusa*). Jour. de Conch., 2d ser., ii. t. 12. f. 2.
Bermonti (*Terebra*), Lorois. J. C., 2d ser., ii, 389, 1857.
= *T. pertusa*, Born. T. Mon. 1865. 23

130. *T. bermonti*, Lorois, the same as *T. pertusa*, Born. R. 1860