

325 1007 33-4

BITORQUATA
DESH 1859 (144)
= CORRUGATA

209. *TEREBRA BITORQUATA*, Desh.

Terebra corrugata, var. *junior*, Kiener, Icon. des Coq. Viv. p. 25. note, pl. 13. f. 31 a.

T. testa elongato-turrita, angusta, acuminata, multispirata, pallide flava, flammulis longitudinalibus castaneis picta, punctulis concoloribus, interstitialibus in margine suturali regulariter dispositis; anfractibus angustis, superne ad suturam inflato-bimarginatis, marginibus inaequalibus, regulariter granulosis; margine inferiore majore; ultimo anfractu brevi, flammulis ad peripheriam interruptis; apertura brevi, subquadrata, margine dextro paulo excavato; columella brevi, cylindracea, contorta, basi anguste et profunde emarginata.

Long. 75 mill., largeur à la base 15. DESH 1859 p 313

Hab. — ?
Collection de M. Crosse.

Nous soupçonnions depuis longtemps que la variété *junior* du *Terebra corrugata* de M. Kiener devait constituer une espèce distincte, mais n'ayant sous les yeux ni le type de Lamarck ni la variété de M. Kiener, nous avons hésité de les séparer jusqu'au moment où M. Crosse voulut bien nous communiquer un bel individu adulte de la variété de M. Kiener. Dès lors les doutes disparurent, car cette coquille est en effet parfaitement distincte du *corrugata*. Elle est particulièrement remarquable par la double collier de perles qui accompagne la suture, la rangée supérieure est la plus grosse et la plus épaisse, et l'interval des granulations est occupée par une linéole d'un beau brun.

DESH 1859 p 313

209. *T. bitorquata* Desh. P.Z.S., 1859, 313. Hab. ? Type in coll. Crosse. New name for Kiener's *T. corrugata* Lam. var. *junior*, Coq. Viv., p. 25 note, pl. xiii, f. 31a. T 44



32
T. corrugata
var. *bitorquata*
Lam.

TR 401 1865

Corrugata, var. *junior* (*Terebra*), Kien. Ic. coq., p. 25, note, pl. 13, f. 31 a. = *T. bitorquata*, Desh.

Bitorquata (*Terebra*), Desh. Proc. Zool. Soc., 1859, p. 313. = *T. corrugata*, Lam.

32. *Terebra corrugata*, var. *bitorquata*, Desh. Kiener, Iconog., t. 13, f. 31 a,

209. *T. bitorquata*, Deshayes, variety of *T. corrugata*, Lamarck. KU 18106

274. *Terebra corrugata* Lamarck, var. *bitorquata* Deshayes. Coquille de 40 à 70 mm., de forme très allongée et présentant des tours extrêmement nombreux, ornés à la partie supérieure, de deux cordons spiraux régulièrement granuleux de force inégale, le supérieur étant plus fort que l'autre. Coloration cornée, marquée de taches brunes irrégulières.

Connue par quelques exemplaires récoltés dans la région de Dakar.

NICKES 1850 p 134

