



♂

G. VIII. 3. Buccinum G. VIII. 3. Die weiße
candidum. Nadel.

Testa turrita subulata laeui; Die gehörnte ahlförmige
anfractibus integerrimis, prope glatte Schale hat ungeheilte
futuram incrassatis. ganzrandige Gewinde, die bei
der Nadel sich verdicken.

Testa subulata laevis. Anfractus Die ahlförmige Schale ist glatt.
circiter viginti, indivisi, integer- Die Gewinde, deren helläufig
rimi, supra prope futuram incrassati, zwanzig sind, nahe an der Nadel.
supremi linea transversa bifariam partiti, & juxta futuram Die obersten sind durch eine neue
crenulati. Apertura, & basis con- Querlinie in zwey Theile getheilt,
generum. Color niveus. und an der Nadel gekerbt. Die
Mündung und der Grund sind wie
an den Nebenarten beschaffen. Die
Farbe schneeweiss.

BORN 1778 p 257

BUCCINUM CANDIDUM.

Germ. Die weiße Nadel.

TAB. X.
f. 8.

Testa turrita, subulata, laevi, anfractibus integerrimis, prope futuram incrassatis.

TAB. X. fig. 8.

Testa turrita, subulata, laevis; Anfractus circiter viginti, indivisi, integerrimi, supra prope futuram incrassati, supremis linea transversa bifariam partitis, & ad futuram crenulatis; Apertura & basis congenerum; Color niveus.

Long. 4. poll. 7. lin. lat. 7. lin.

BORN 1778 p 253

Patria ignota.

Candidum (Buccinum), Born. Mus., p. 263, t. 10, f. 8.
= Terebra crenulata, Linn.

8

?

TRYON 1885.

TERONI
I guess he was drunk that day !! (J.H)
OR IT WAS BORN !