

(ANILIS)

35. TEREBRA CIRCINATA. Deshayes. (Pl. IV, fig. 6, 7.)

p 99

T. testa elongato-subulata, angusta, fusca; anfractibus numerosis, angustis, in medio excavatis, ad suturam biserialim plicato-crenatis, bimarginatis, in medio transversim quadristriatis; ultimis anfractibus plicis longitudinalibus decussatis, ultimo ad peripheriam sulco majore crenulato, circumdato; apertura minima, elongato-angusta, canali contorto, brevi latoque terminata; labro sinistro proeminente.


Var. : β Testa minore, margine suturali latiore.

Habite les mers de Chine.

Si l'on ne recherchait avec soin les caractères de cette espèce, on pourrait facilement la confondre avec l'Acuta; elle a la même forme, la même taille et la même couleur, mais les tours, au lieu d'être partagés par un simple sillon, présentent d'abord au-dessus de la suture un large bourrelet plissé et crénelé, et au-dessus de lui, séparé par un sillon, un second bourrelet moins élevé et plus étroit, chargé de granulations. Le reste de la surface du tour est concave, et l'on y trouve des stries transverses invariablement au nombre de quatre. Dans plusieurs individus, les derniers tours portent des plis longitudinaux assez réguliers. A la circonférence du dernier tour s'élève un angle obtus souvent noduleux, au-dessus duquel on trouve de très-fines stries transverses souvent onduleuses et au nombre de huit. L'ouverture est petite, étroite, terminée par un canal assez long, contourné, large et profond. Cette coquille est d'une couleur uniforme d'un brun marron foncé, un peu enfumé.

Longueur 42 mill.; largeur 6.

Collection de M. Cuming. DESH 1857 p 99



39b

39b, Holotype of T. circinata Deshayes, British Museum (N.H.) No. 1979150; 41.3 mm. BRAT P7



866

866 Terebra circinata Deshayes Delagoa Bay, Moçambique 67,5 x 11 mm Colour: Salmon-pink KENSLEY 73 p 114



44

Circinata (Terebra), Desh. Jour. Conch., 1857, p. 99, pl. iv, f. 6-7. = T. straminea, Gray, T. circinata Desh. = straminea

44. Terebra circinata, Desh. (=straminea). Jour. de Conch. 2d ser., ii. t. 4, f. 6. TRYON 1885

218. TEREBRA CIRCINATA, Desh.

T. testa elongato-subulata, angusta, fusca; anfractibus numerosis, angustis, in medio excavatis, ad suturam biserialim plicato-crenatis, bimarginatis, in medio transversim quadristriatis; ultimis anfractibus plicis longitudinalibus decussatis, ultimo ad peripheriam sulco majore crenulato circumdato; apertura minima, elongato-angusta, canali contorto, brevi latoque terminata; labro sinistro proeminente.

Var. β. Testa minore margine, suturali latiore.

Long. 42 mill., larg. 6.

Hab. Mers de la Chine.

Collection Cuming et la mienne. DESH 1857 p 315

28. Terebra (Strioterebrum) circinata Deshayes.

DESHAYES. Journ. de Conch. 1857, p. 99, Pl. 4, fig. 6, 7.

REEVE. Conch. Ic. Vol. XII, Terebra, fig. 47a (straminea var.).

TRYON. Man. of Conch. Vol. VII, p. 28, Pl. 8, fig. 44 (straminea var.).

Stat. 2. Madura-strait. 56 M. Grey mud with some radiolariae. 1 Spec.

Stat. 4. Djangkar (Java). 9 M. Coarse sand. 28 Spec.

I think REEVE's figure differs considerably from that of DESHAYES, which represents a smaller shell, the Siboga-specimens are still smaller. Perhaps they belong to DESHAYES' var. β.

SCHLÖN 1913 p 375

52. circinata, Terebra - DESHAYES, 1857, J. C. P., 6: 99, pl. 4, figs. 6, 7. Hab. les mers de Chine. Coll. Cuming. Size: 42 x 6 mm. Holotype: 41.3 mm (marked x inside aperture). — Terebra anilis (RÖDING, 1798). C69

218. T. circinata, Deshayes, variety of T. straminea, Gray. W 13606 Terebra circinata Desh.

Delagoa Bay. One animal examined: no radula. BARNARD 58 J-A p 79

218. T. circinata Desh. J. Conchyl., vi, 99, pl. iv, f. 6, 7. China. Type B.M. = anilis Röding. T 44