

Var. *circumvoluta* (CHEMNITZ) nom. nov.

(Planche I, fig. 4.)

1780. *Subula fascia circumvoluta*, CHEMNITZ, Conch. Cab., IV, p. 292, pl. CLIV, fig. 1444.
 1793. *Buccinum dimidiatum*, SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 170.
 1798. *Epitonium Dimidiatum*, RÖDING, Mus. Boltenianum, II, p. 94.
 1817. *Subula dimidiata* Lin., SCHUMACHER, Nouv. Syst., p. 233.
 1840. *Terebra dimidiata* Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 41.
 1841. *Terebra dimidiata* Lin., KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 7, pl. 1, fig. 8.
 1885. *Terebra dimidiata* Lin., TRYON, Man., VII, p. 9, pl. 1, fig. 13 (excl. fig. 4).

REMARQUE. — Cette variété, dont nous empruntons le nom à Chemnitz, se distingue du type par l'adjonction aux taches longitudinales blanches, de deux zones, également blanches, sur le dernier tour et dont la supérieure remonte plus ou moins sur le milieu des tours précédents.

DZS 1935 p 22



var. *circumvoluta*
(CHEMN.) NOM. NOV.