

DIVISA (198)
PEASE 1868
= DILLWYNII

TEREBRA DIVISA, Pease.

1857. *T. concinna*, Desh. non Dill., Jour. de Con., pl. 3, fig. 10.

The figure as above will distinguish this species from any variety of *strigilata*.
PEASE 1868 p 124

(AFTER STRIGILATA) Var. **divisa** PEASE

(Planche I, fig. 8.)

1742. *Vis* ..., D'ARGENVILLE, Hist. Nat., p. 176, pl. 14, fig. R.

1757. *Vis* ..., D'ARGENVILLE, La Conchyl., p. 232, pl. 11, fig. R

1780. *Vis* ..., FAVANNE, La Conchyl., pl. XXXIX, fig. L¹.

1844. *Terebra concinna*, DESHAYES in LAMARCK, Anim. sans vert., 2^e édit., p. 259.

1868. *Terebra divisa*, PEASE, Amer. Journ. of Conch., IV, p. 124 (= *concinna* Deshayes, → 1857!! non Dillwyn).

1908. *Terebra strigilata* L. var. *concinna* Desh., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 4.

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Buin : Sud de Bougainville (Collect. Ph. D. x R. P. Waché).

REMARQUE. — En 1844, Deshayes a nommé *T. concinna* cette variété du *T. strigilata* en disant que seule la figure de d'Argenville, planche 11, figure R, en donne une idée satisfaisante. Elle est plus étroite, plus allongée que le *strigilata* typique. Mais en 1859, Deshayes (Journ. de Conchyl., VI, p. 98, pl. III, fig. 10) a décrit sous le même nom *concinna* une espèce tout à fait différente, aussi bien de son *concinna* de 1844 que du *Buccinum concinnum* de Dillwyn.
1857!!?



var. *divisa* PEASE

DZB 1935 726

NOTE: DZB MAKES AN ERROR. DIVISA IS N. NOV FOR CONCINNA DESH. 1857 NOT FOR DESH 1849. PEASE EVEN WRITES THE ABOVE FIG (DESH 1844) WILL. DISTINGUISH THIS SPEC. FROM STRIGILATA