

*T. easmithi* Aubry, 1999

(n. sp)

**Materiale esaminato**

n. 2 esemplari raccolti da subacquei in Ningaloo Marine Park a 35 m, in sabbia.

**Descrizione**

Conchiglia piccola le cui dimensioni vanno da un minimo di 4 mm ad un massimo di 6 mm di lunghezza e 1,5 mm di larghezza. La protoconca è formata da 3 giri e la teleoconca da 8 giri, con profilo dritto. Il solco suturale è ben evidente, la banda sottosuturale è formata da costole assiali in numero di 14, che sono il prosiegno di quelle che formano il disegno dei giri. Non sono evidenti strie o linee spirali. Il colore è uniformemente arancio chiaro con una banda più scura alla periferia dell'ultimo giro. La columella è dritta e l'apertura quadrata.

**Olotipo**

6 x 1,5 mm (Aubry, coll.)

**Paratipo**

n. 1 esempl. (Aubry, coll.)

**Località tipo**

Ningaloo Marine Park W.A.

**Discussione**

Pur trovandosi in letteratura specie con alcuni caratteri morfologici simili a *T. easmithi*, tali rassomiglianze non sono determinanti per uguaglianza tassonomica in una visione globale della conchiglia. Non mi è stato possibile paragonare gli esemplari da me studiati con *T. bratcheræ* Cernohorsky, 1987, la cui protoconca, formata da 1,5 giri e la cui scultura degli stessi la differenziano in maniera lampante. Gli esemplari di *T. easmithi* in mio possesso furono trovati in fondali sabbiosi a circa 10 metri di profondità ed in diverse immersioni.

---

*T. easmithi* Aubry, 1999

(n. sp)

**Material examined**

Two specimens found by underwater divers in Ningaloo Marine Park, at a depth of 35 m, in sand.

**Description**

A small shell whose size varies from a minimum of 4 mm to a maximum of 6 mm in length and 1.5 mm in width. The protoconch is formed of 3 whorls and the teleoconch of 8 whorls, with straight profile. The sutural groove is clearly seen, the sub-sutural band is formed of axial ribs, 14 in number, that are the continuation of those that form the pattern of the whorls. Grooves or spiral lines are not in evidence. The colour is uniformly light orange with a darker band on the edge of the last whorls. The columella is straight and the aperture square.

**Holotype**

6 x 1.5 mm (Aubry, coll.)

**Paratype**

n. 1 specimen (Aubry, coll.)

**Type locality**

Ningaloo Marine Park W.A.

**Discussion**

Despite finding species with some morphological characteristics similar to *T. easmithi* in existing literature, such similarities do not indicate an identical species in a global vision of the shell. It has not been possible to compare the specimens studied with *T. bratcheræ* Cernohorsky, 1987, whose protoconch formed of 1.5 whorls and the sculpture of which differentiate it totally. The specimen of *T. easmithi*, studied were found in sandy zones at about 10 m depth, on various occasions.