

SEE BOUCHET 1983
(SENEGALENSIS)

FESTIVA
Desh 1857

197

= SENEGALENSIS

17. *T. festiva* Desh. *J. Conchyl.*, vi, 74, pl. iii, f. 4. Senegal. Types
(3) B.M. = *ferruginea* Born. T44

76. *festiva*, *Terebra* - DESHAYES, 1857, *J. C. P.*, 6: 74, pl. 3, fig. 4. Hab. le Sénégal. Coll. Cuming. Size: 35 x 8 mm (39 x 8 mm in 1859). Holotype: 35.5 mm; syntypes: 36.7 mm (wrongly marked x in aperture), and 32.8 mm. = *Terebra senegalensis* LAMARCK, 1822. c69

TEREBRA FESTIVA
(Deshayes, 1857) 45
mm. - Dalla Guinea
alla Costa d'Avorio.
Lino a 10 m.

AUBRY PL 4

17. TEREBRA FESTIVA, Desh.

T. testa elongato-conica, angusta, acuminata, fulva; anfractibus latis, sulco impresso divisis; margine suturali lato, plicis nodulosis, crassiusculis, albicantibus notato, interstitiis castaneis; altera parte anfractuum tenue et regulariter plicata, interstitiis simplicibus, obsolete maculis pallide castaneis, biseriatis, in ultimo anfractu triseriatis picta; ultimo anfractu elongato; apertura oblonga, angusta, late emarginata.

Long. 39 mill., larg. 8.

Hab. Sénégal.

Collection Cuming et la mienne.

DESH 1857 p248

Terebra festiva Deshayes.

1857. *Terebra festiva* Deshayes, *Descr. esp. nouv. du Genre Terebra*, in *Journ. de Conch.*, VI, p. 74, pl. III, fig. 4.

Campagne de 1908. Bilaouak.

Dispersion. — Sénégal.

C'est à tort que Reeve et quelques autres auteurs ont considéré cette espèce comme synonyme de *T. senegalensis*. Elle est, en effet, plus petite, plus étroite, pourvue de côtes longitudinales plus espacées et ornée de taches subsuturales plus régulières, mieux marquées et plus nombreuses. D2B 1910 p60

17. *T. festiva*, Deshayes, young of *T. senegalensis*, Lamarck. RV 18603

9. TEREBRA FESTIVA. Desh. (Pl. III, fig. 4.) p74

T. testa elongato-conica, angusta, acuminata, fulva; anfractibus latis, sulco impresso divisis; margine suturali lato, plicis nodulosis, crassiusculis, albicantibus notato, interstitiis castaneis; altera parte anfractuum tenue et regulariter plicata, interstitiis simplicibus, obsolete maculis pallide castaneis, biseriatis, in ultimo anfractu triseriatis picta; ultimo anfractu elongato; apertura oblonga, angusta, late emarginata.

Habite le Sénégal.

Cette coquille a beaucoup d'analogie avec le *Terebra Senegalensis*, on pourrait la prendre pour un jeune âge de cette dernière; mais en comparant des coquilles d'égale grandeur, on reconnaît entre elles des différences constantes. Celle-ci est allongée, assez étroite, régulièrement conique, formée de douze tours fort larges, aplatis et inégalement partagés par un sillon transverse; le bourrelet forme le tiers de la largeur totale, il est garni de gros plis très-réguliers sur les premiers tours, tuberculeux et moins réguliers sur les derniers; des taches d'un beau brun marron brillent entre les plis blanchâtres. Le reste de la surface est occupé par des plis fins, réguliers, dont les interstices sont parfaitement lisses; cette partie de la coquille est d'un beau fauve et elle est ornée d'une ou de deux zones de grandes taches d'un brun pâle; le dernier tour porte trois rangs de ces taches, et elles sont plus foncées. L'ouverture est très-allongée, étroite, subquadrilatère, terminée en avant par une large échancrure.

Les exemplaires que nous avons sous les yeux ne sont peut-être pas adultes, car le bord droit est extrêmement mince, ils ont 35 millim. de long et 8 de diamètre.

Collection de M. Cuming.

DESH 1857 p74



T. festiva
col
= Senegalensis



197b

BLAT 87 197b, Lectotype of *T. festiva* Deshayes, British Museum (N.H.) No. 197958; 35.5 mm.

45. *Terebra festiva*, Desh. (= *Senegalensis*). *Jour. de Conch.*, 2d ser., ii, t. 3, f. 4.

Festiva (*Terebra*), Desh. *Jour. Conch.*, 1857, p. 74, pl. iii, f. 4. = *T. Senegalensis*, Lam.

T4405 1885