

7 (by error 6). *T. fimbriata* Desh. *J. Conchyl.*, vi, 71, pl. v, f. 1. Hab. ?  
One syntype. B.M. = *crenulata* L. T44

FIMBRIATA(1)

DESH 1857

(1) = CRENULATA

79. *fimbriata*, *Terebra* - DESHAYES, 1857, *J. C. P.*, 6: 71, pl. 5, fig. 1. Hab. ? (Coll. Cuming and Deshayes in 1859). Size: 88 x 19 mm. Paratype: 71.7 mm (holotype probably in École des Mines in Paris). = *Terebra crenulata* (LINNAEUS, 1758). C69

TEREBRA FIMBRIATA  
(Deshayes, 1857) 89  
mm. - Indo-Pacific  
In aqua calidissima  
à Bassa (35 m)

AUBRY PL 8

6. *TEREBRA FIMBRIATA*, Desh.

*T. testa elongato-conica, basi lata, apice acuminata, castaneo-fuscescente alboque marmorata, ad marginem superiorem lineis brevibus, castaneis fimbriata, punctulis castaneis, biserialim distantibus, in ultimo anfractu triseriatim ornata; anfractibus latis, planis, sulco impresso divisus; primis tenue plicatis, alteris laevigatis; margine suturali convexiusculo, obsolete noduloso; nodulis saepius albis; apertura elongato-angusta, subquadrata, intus fusca, basi late emarginata; columella alba cylindracea.*

Long. 88 mill., larg. 19.

Hab. — ?

Collection Cuming et la mienne.

DESH 1857 PL 76



FIG. 10. *Terebra fimbriata* Deshayes, 1857, holotype.

*Terebra fimbriata* Deshayes, 1857, holotype, fig. 10. Figured by Deshayes, pl. 5, fig. 1. Length 88.6 mm. Original measurements 88 x 19 mm. Type locality unknown. There is a paratype in the British Museum (Natural History). This taxa is a junior synonym of *T. crenulata* Linnaeus, 1758.

BRATCHEA 77 VEL 31(2) p

6. *TEREBRA FIMBRIATA*. Desh. (Pl. V, fig. 1.).

p 71

*T. testa elongato-conica, basi lata, apice acuminata, castaneo-fuscescente alboque marmorata; ad marginem superiorem lineis brevibus, castaneis fimbriata, punctulis castaneis, biserialim distantibus, in ultimo anfractu triseriatim ornata; anfractibus latis, planis, sulco impresso divisus; primis tenue plicatis, alteris laevigatis; margine suturali convexiusculo, obsolete noduloso; nodulis saepius apice albis; apertura elongato-angusta, subquadrata, intus fusca, basi late emarginata; columella alba, cylindracea.*

Patrie inconnue.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec le *Terebra crenulata* de Lamk. Cette dernière, comme on le sait, est très-variable dans sa forme et ses couleurs; une variété figurée par Seba a les crénelures presque entièrement effacées, elle est marbrée de brun jaunâtre sur un fond fauve, et sur chaque tour se montrent deux rangées de petits points bruns; un troisième rang s'ajoute à la base du dernier tour. C'est avec cette dernière variété que le *Terebra fimbriata* a le plus de rapports. Elle est proportionnellement plus large à la base, les marbrures de brun et de jaunâtre sont irrégulières. Si le bourrelet marginal est très-nettement séparé par un sillon sur les premiers tours, il disparaît sur les derniers; d'abord tuberculeux, ce bourrelet devient lisse, et c'est sur lui que se montre une frange de linéoles brunes ou onduleuses plus ou moins serrées. La base de l'ouverture est largement ouverte par une échancrure. La columelle cylindrécée est blanche et elle est nettement détachée au dehors par un sillon surmonté d'un angle décurrent assez aigu.

Long. 88 mill.; diamètre de la base 19 mill.

Collection de M. Cuming et la mienne. DESH 1857 p 71



11a. Lectotype of *T. fimbriata* Deshayes, Muséum National Histoire Naturelle, Paris; 87.0 mm.

BRATCHEA 87

FIMBRIATA (?)  
 DESHAYES 1857  
 (11) = CRENULATA



var. fimbriata  
 DESH.

REMARQUE. — Le *T. fimbriata* est certainement une variété du *T. crenulata* chez laquelle les tubercules couronnant les tours sont plus nombreux, moins sail-  
 lants et parfois même presque effacés, mais on rencontre des spécimens inter-  
 médiaires qui relient entre elles les formes extrêmes et qui montrent qu'ils appars-  
 tiennent tous à une même espèce. Deshayes l'avait déjà pressenti en disant que  
 son *T. fimbriata* se rapproche beaucoup d'une variété de *crenulata* représentée par  
 Seba. Or, cette variété ne peut être que celle de la figure 17 que nous considérons  
 comme étant synonyme de *fimbriata*.

La taille de cette variété est aussi peu constante que celle du *crenulata*  
 typique : l'exemplaire que Y. Hirase nous a envoyé des îles Loo-Choo mesure  
 105 millimètres de hauteur, tandis que celui figuré par Deshayes n'a que 73 milli-  
 mètres.

Dillwyn, puis Tryon ont cité le *Buccinum candidum* de Born (Testacea Mus.  
 Vindobon., p. 263, pl. 10, fig. 8), comme une variété du *T. crenulata*, ce qui n'est  
 pas acceptable; car la figuration de Born représente un *Terebra* entièrement blanc,  
 dépourvu de toute trace de tubercules et présentant un peu au-dessus du milieu  
 des tours une légère angulation.

DZB 1935 p 17

6. *T. fimbriata*, Deshayes, variety of *T. crenulata*, Lamarck. Rev. 1846



Fimbriata (*Terebra*), Desh. Jour. de Conch., 1857, p. 71,  
 pl. 5, f. 1. = *T. crenulata*, Linn. 1759. . . . . 8

*T. fimbriata*, Deshayes (fig. 2) is a variety only, retaining the  
 juvenile characters shown by the upper whorls of this and other  
 smooth species of *Terebra*, namely, longitudinal plications and  
 a strongly marked sutural band. *T. interlineata*, Desh. (fig. 6),  
 is another example of the long persistence of juvenile characters,  
 and may be equally referred here.

VAR OF CRENULATA TRYON 1838

*T. fimbriata* Desh  
 = *crenulata*

2. *Terebra fimbriata*, Desh. (= *crenulata*). Jour. de  
 Conch., 2d ser., ii, t. 5, f. 1.