

113. *Terebra fuscotaeniata* Thiele, 1925

(Pl. 30, fig. 113)

1925 *Terebra fuscotaeniata* Thiele, Wiss. Ergeb. Deut. Tief. Exped. Valdiva 17:345. pl. 29, fig. 22.

**Description:** Shell to 15 mm; color beige with a nebulous dark line at subsutural area and at periphery of body whorl; outline of whorls moderately convex; protoconch of 1½ whorls; subsutural band absent; axial ribs from suture to suture, widely spaced on early whorls becoming less widely spaced later; spiral lines numerous, fine, evenly spaced; aperture quadrate; columella curved.

**Type locality:** "Padang," Sumatra, Indonesia.

**Distribution:** Indonesia.

**Type:** Lectotype MNHUB; 14.7 mm.

**Discussion:** All in the type lot were collected dead and were fragmented. The species is known only from the type lot and has not been subsequently reported.

B-113 - 110



113

113, *T. fuscotaeniata*

Thiele. Lectotype Zoological Museum Humboldt University, Berlin; 14.7 mm.

*Terebra fuscotaeniata* n. sp.

(Tafel 29 Figur 22.)



22

Einige meistens nicht gut erhaltene Schalen sind durch eine rotbraune, durch die Rippen unterbrochene Binde auf der Mitte der Windungen und den ebenso gefärbten unteren Teil der letzten Windung ausgezeichnet, die Zwischenräume zwischen den Rippen haben einige deutliche Linien. Die Embryonalschale hat nur 2 Windungen, deren erste ziemlich groß und rundlich ist; bei der größten, aber anscheinend noch nicht ausgewachsenen Schale folgen 13 wenig gewölbte, aber durch eine deutliche Naht getrennte Windungen, die mit kantigen, nicht regelmäßig zusammenhängenden Rippen besetzt und in den Zwischenräumen mit einigen eingedrückten Linien versehen sind, letzte unten abgerundet kantig, mit ziemlich kräftigem und kurzem Siphonalfortsatz, Mündung klein. Höhe der größten Schale 15 mm, Durchmesser 2,75 mm. Thiele 1925 p 345

22.

„ *fuscotaeniata* Th. × 4. Seite 311.