

Nuove Terebre dall'Angola

Umberto Aubry

Key Words

Gastropoda, Neogastropoda, Terebridae, Terebra, Angola.

Introduzione

Anni or sono ho ricevuto in dono alcuni lotti di Terebre raccolte mediante dragaggi a profondità variabile da 10 m a 20 m in diverse località del mare delle coste Angolane e precisamente a Farol das Lagostas e nella Baia do Cacuaco, ubicate a Nord di Luanda. Dopo uno studio accurato mi sono convinto a descriverne alcune ritenendole non ancora classificate o di dubbia identificazione.

Riassunto

Vengono descritte, dal punto di vista conchigliologico, cinque nuove Terebre raccolte nel mare delle coste dell'Angola.

Sistemática

Famiglia: Terebridae Mörch, 1852

Genere: *Terebra* Mörch, 1852

(Specie tipo: *Terebra subulata* Linnaeus, 1767)

Terebra gabriellae sp. n.

Materiale esaminato

N. 5 esemplari dragati da 10 m a 15 m di profondità in substrato di sabbia e fango nel mare di Farol das Lagostas a nord di Luanda, Angola

Materiale tipo

Olotipo 15,70 mm x 3,14 mm - MMM Cupra Marittima

Paratipo 1 13,70 mm x 3,14 mm - Coll. dell'Autore

Paratipo 2 13,65 mm x 2,80 mm - Coll. dell'Autore

Paratipo 3 13,61 mm x 2,70 mm - Coll. dell'Autore

Paratipo 4 9,49 mm x 2,40 mm - Coll. dell'Autore

Località tipo

Farol das Lagostas, Angola.

Distribuzione

Fino ad oggi conosciuta solo per la località di ritrovamento.

Descrizione

Conchiglia piccola d'aspetto solido e lucente. L'altezza negli esemplari esaminati varia da 15,70 mm a 9,49 mm e la larghezza all'ultimo giro da 3,14 mm a 2,40 mm. Il colore è bianco crema che in alcuni esemplari, diventa marrone chiaro sulla banda sottosuturale. La protoconca, multispirale, è di 4 giri lisci e leggermente globosi. I giri della



T. gabriellae olotipo

teleoconca variano da 9 a 12 il profilo dei quali è leggermente convesso specie negli ultimi. La sutura ben incisa ed il solco sottosuturale ben evidente delimitano una stretta banda sottosuturale la cui scultura è formata da numerose costole assiali che sono il prolungamento di quelle del giro sottostante e dal quale sono separate da un evidente solco sotto-

suturale che incide di netto codeste costole. Il numero delle costole assiali è notevole se ne contano fino a 24 nell'ultimo giro e sembrano costituire una palizzata. Codeste costole sono attraversate da numerose e microscopiche strie spirali, più evidenti negli ultimi giri. La columella è leggermente curva e l'apertura ovale e stretta

Discussione

Solo *T. gaiae* fra le terebre West-Africane può essere presa in considerazione per una eventuale conspecificità. Vien da pensare che *T. gaiae* possa essere una forma giovanile del taxon ora descritto, ma i caratteri conchigliari ben evidenti macro e microscopicamente non propendono per queste ipotesi. Per il confronto con *T. pseudoturbonilla* Talavera, 1975 vale quanto detto nella discussione di *T. gaiae*.

Derivatio nominis

Dal nome di mia sorella, appassionata conchigliologa.