

ACCULATUM

GML 1791

= SOLIDA 216

145. B. telia alba: fasciis fuscis punctorum excavatorum.
Martini, Conch. 4. t. 155. f. 1457. GML 1791
Habitat - - - - - P3503



Fig. 1214.
E. aciculata
C. H. M. 1791

THERE
Lamarck's

Vis aciculée, *Terebra aciculata*. p. 17
Blanche, avec des fascies brunes et des
points enfoncés.

Martini, Conch. 4. tab. 155. fig. 1457.
On ignore son pays natal. GML 1791
Bosc 801 p. 17

THERE LAMARCK'S



Die letzte Untergattung *Euryta* Adams wurde ihrer spindelförmigen Gestalt und ihres bauchigen letzten Umganges wegen früher zu *Buccinum* oder *Bullia* gerechnet, ihre Zugehörigkeit zu *Terebra* ist erst noch zu erweisen. Sie bildet einen sehr hübschen Uebergang zur folgenden Gattung. — *Terebra aciculata* Lamarck (Taf. 33 fig. 4), nicht zu verwechseln mit *T. aciculina* Lam., die eine ächte *Terebra* ist, zeichnet sich durch eine doppelte Knötchenreihe unter der Naht aus; die Zeichnung ist äusserst verschieden, meist bläulich-weiss mit rothbraunen Linien und einem bläulichen Band unter der Naht. Diese Art wird häufig als europäisch aufgeführt, kommt aber nur zufällig mit Ballast dahin; ihre Heimath ist am Senegal.

KOEBEL 1871 p. 21