

CASTANEA
KIENER 1839

= HECTICA (226)



226b

BRAT 24 226b. Holotype of *T. castanea* Kiener. Museum d'Histoire Naturelle, Geneva No. 1152/72; 55.0 mm.



68
T. castanea
Kiener
= *cinerea*

77. *T. castanea*, Kiener, variety of *T. cinerea*, Born. KN 1860b.

68. *Terebra castanea*, Kiener (= *cinerea*, var.). Kiener
Iconog., t. 7, f. 14.

Castanea (*Terebra*), Kien. Coq. viv., pl. 7, f. 14.
= *T. caerulea*, Lam. TP 450: 1425 . . . 31
NOTE: IN TEXT = *CINEREA* BORN!

77. **TEREBRA CASTANEA**, Kiener.
Terebra castanea, Kiener, Icon. des Coq. Viv. p. 19. no. 14, pl. 7.
f. 14.
Hab. Ile de France; Océan Indien.
Cette espèce comme les précédentes a les plus grands rapports avec
le *jamaicensis*.
DLSH 1819 p290

14. **VIS MARRON.** *Terebra castanea*, NOBIS.

(Collect. MASS. et MUS.)

Pl. VII, fig. 14.



T. testâ turrito-subulatâ, elongatâ, levi, nitido-castane; anfractibus indivisis, planulatis, præsertim prope suturas longitudinaliter minutissimè plicatis, albis lineis cinctis.

Coquille allongée, subulée, polie, à spire longue et fort pointue au sommet, composée d'un grand nombre de tours étroits, faiblement aplatis, séparés entre eux par une suture linéaire: ces tours, lisses sur une partie de leur étendue, sont pourvus de petits plis nombreux, longitudinaux, placés au-dessous de la suture; quelquefois ces plis disparaissent presque complètement. L'ouverture est petite, ovale-oblongue, dilatée à la base, rétrécie au sommet, de couleur fauve en dedans; le bord droit est mince, tranchant, sinueux, arrondi à son extrémité inférieure; la columelle est cylindracée, épaisse, oblique. La couleur extérieure de cette coquille est un beau marron brillant, plus ou moins intense; la suture est quelquefois bordée d'un liseré blanchâtre.

Long. 26 lignes.

Habite les mers des Indes, l'Ile-de-France.

Cette espèce ne paraît différer réellement de la précédente que par un peu plus de développement, mais sa coloration, d'un brun marron très-prononcé, l'en sépare véritablement.

KN 1838-39 p19