

SEE BOUCHET AT CONCINNA DESH 1857

CONCINNA  
DILLWYN 1817

= STRIGILATA : DAUTZ. 1935 p. 24-36-37

= STRIGILATA  
206

Concinnum (Buccinum), Dillwyn. Cat., p. 647.  
= *Terebra strigilata*, Linn. . . . . 33

TRAYON 1985

† 34. Vis parée. *Terebra concinna*. Desh.

*T. testâ subulatâ, angustâ, anfractibus planulatis, longitudina-liter, profundè striatis suturis subcrenulatis; aperturâ minimâ elongatâ, angustâ, anfractibus supernè zonulâ albâ punctisque fuscis ornatis: ultimo basi zonâ albâ instructo.*

*Buccinum strigilatum*. Var.  $\beta$ . Gmel. p. 3501.  
Schrot. Einl. t. 1. p. 401. *Buccinum*. n° 173.  
D'Argenv. Conch. pl. 11. f. R.  
*Buccinum concinnum*. Dillw. Cat. t. 2. p. 647. n° 144.  
Habite Amboine.

Espèce voisine du *Strigilata*, mais distincte. La seule figure de d'Argenville en donne une idée satisfaisante: c'est une des trois espèces confondues par Linné dans son *Buccinum strigilatum*.

Elle est une des espèces les plus étroites, proportionnellement à sa longueur. Elle se compose de dix-sept ou dix-huit tours à peine convexes, sur lesquels s'étendent, d'une suture à l'autre, des stries étroites, mais enfoncées, d'une parfaite régularité, et se suivant, d'un tour à l'autre, du sommet à la base. Il n'existe aucune trace de stries transverses, et les tours ne sont point divisés par un sillon médian, comme dans la plupart des autres espèces. L'ouverture est petite, étroite, près de deux fois aussi longue que large. Son bord droit est brun en dedans, et divisé à-peu-près, par le milieu, par une zone étroite d'un beau blanc. La columelle est oblique; elle est accompagnée à la base d'un petit bourrelet blanc, qui la contourne jusqu'à l'extrémité de l'échancrure terminale. On remarque à son extrémité un petit bourrelet brun, décurrent, en forme de pli, et qui circonscrit en dedans l'échancrure de la base, de la même manière que dans les Buccins. La coloration de cette espèce la rapproche beaucoup du *Terebra strigilata* de Lamarck. Elle est d'un brun violacé pâle, quelquefois grisâtre, et les tours sont ornés, à leur sommet, d'une zone blanche plus ou moins large, selon les individus, sur laquelle sont rangées, en une seule série, des ponctuations d'un brun rouge, assez grosses, arrondies ou subquadrangulaires. A la base du dernier tour, à l'endroit même où s'applique l'extrémité du bord droit, se trouve une autre zone blanche, étroite et sans ponctuation.

Cette espèce est longue de 3 $\frac{5}{8}$  millim., et large de 6.

D&N-E 194r p 219

59. TEREBRA CONCINNA, Desh.

*Terebra concinna*, Desh. dans Lamk. An. s. Vert. ed. 2. x. p. 259; D'Argenville, Conch. pl. 11. f. R.

*Buccinum strigilatum*, var.  $\beta$ . ex parte Gmel. p. 3501.  
*Buccinum concinnum*, Dillw. Cat. t. ii. p. 647. no. 144.

Hab. — ?

Desh 1859 p 282

CONCINNUM. 144. Shell subulate, longitudinally striated, with the whirls undivided, and marked at the sutures with a spotted belt.

*Buccinum strigilatum*. *Born Mus.* p. 265. t. 10. f. 10.  
*Buccinum strigilatum*, Var.  $\beta$ . *Gmelin*, p. 3501.  
*Buccinum*, No. 173. *Schroeter Einl.* i. p. 401.  
*Murex strigilatus*. *Gmelin*, p. 3564.  
*Gualter*, t. 57. f. O. *Argenville*, t. 11. f. R.

Inhabits —

Shell an inch and a quarter long, and about one fifth as broad, with a white belt at the sutures, which is marked with large brown spots. Two of the three figures which Linnæus has cited for *B. strigilatum*, belong to the present species, and are quite different from Rumphius, t. 30. f. H, which best answers to his description.

Dillw. 1817 p 647