

67. *TEREBRA CROSSII*, Desh.

T. testa elongato-turrita, angusta, apice acuminata, longitudinaliter plicata, nitida, cærulescente, zona alba maculis rubro-fuscis interrupta ad basin anfractuum ornata, venulis ramosis sanguineis in parte superiore anfractuum dispersis; anfractibus planulatis, linea vix impressa subæqualiter divisis, ultimo brevi, attenuato; columella alba, extus basi angulo acuto circumdata.

Long. 23 mill., larg. 5.

Hab. L'océan de l'Inde.

Collection de M. Crosse.

Espèce remarquable par sa coloration d'un bleu peu foncé, interrompu à la base des tours par une large zone blanche interrompue par des taches d'un beau brun rougeâtre; de ces taches partent des lignes rameuses qui occupent tout la largeur des tours; ces linéoles sont d'un brun rouge foncé et ressemblent à de petites veines sanguinolentes. La surface est brillante, couverte de gros plis; une strie transverse à peine apparente divise les tours en deux parties presque égales.

DESH 1859 p 289

CROSSEI

DESH 1859

= PENICILLATA

(212)

67. *T. crossii* Desh. *P.Z.S.*, 1859, 289. Indian Ocean. Type in Crosse Coll.: the B.M. has a specimen. This = *venosa* Reeve non Hinds, and, vide Smith = *subdivisa* Philippi in *Zeitschr. f. Malak.*, viii, p. 96. 744




FIG. 4. *Terebra crossii* Deshayes, 1859, holotype.

67. *T. crossii*, Deshayes, variety of *T. venosa*, Hinds. *R.V.* 1710b


Crosse (Terebra), Desh. *Proc. Zool. Soc.*, 1859, p. 289.
= *T. venosa*, Hinds,



13
T. Crossii Desh
= *venosa*

TAMON 1885

13. *Terebra Crossii*, Desh. (= *venosa*). *Conch. Icon.*, f. 95 a,



212d

212d, Holotype of *T. crossii* Deshayes, Museum National d'Histoire Naturelle, Paris; 24.0 mm.

BAAT 87