

Flammulata (Terebra), Martens. Mauritius, 1880, p. 230,  
 pl. 20, f. 5. = T. caerulea, Lam., var. . . . . 31

TRUYON 1885

*Terebra caerulea* var. *flammulata* n. Taf. 20, Fig. 5.

Vgl. Kiener iconogr. pl. 6. Fig. 12d und Reeve conch. icon. XII. Fig. 26a.

Das vorliegende Exemplar von den Seychellen, durch Hrn. Robillard erhalten, ist viel heller als die angeführte Abbildung bei Reeve, zeigt aber doch regelmässige hellbraune Striemen, welche unmittelbar unter der oberen Nath dunkler sind, dann in annähernd gleicher Intensität bis zur Peripherie oder unteren Nath herablaufen, dort durch ein breites weisses Band unterbrochen sind (dem gelben bei Reeve entsprechend) und an der Basis der Schale noch einmal in grösserer Intensität auftreten, so dass sie nahezu ein zusammenhängendes braunes Basalband bilden. In Skulptur und Form nicht von der typischen *caerulea* verschieden; wenn wir uns die Flammen mit Ausnahme des dunkleren Anfanges unter der oberen Nath verschwunden denken, so erhalten wir die gewöhnliche Zeichnung der *caerulea*, wie bei Kiener Fig. 12a—c und Reeve 26b.

MARTENS 1880 p. 230

