

C. B. ADAMS 1850 p 58

15. TEREBRA JAMAIGENSIS C. B. Adams. (Pl. V, fig. 9.)

p 20

T. testa elongato-acuta, griseo-fuscescente vel nigrescente; anfractibus latis, contiguis, sutura lineari junctis, fasciola albidula aliquantisper irregulariter punctata, ad suturam notatis, tenue plicatis; plicis in medio anfractuum evanescentibus, undique sub lente minutissime punctulatis; apertura angusta, superne alternata, basi dilatata, late emarginata; columella obliqua, atro fuscescente; callo albo flavescente, angulo acuto extus separato.

Colore variabili.

- a) Testa omnino alba.
- b) Testa albo-flavescente, basi grisea, anfractibus in fasciola alba, griseo regulariter punctatis.
- c) Testa præcedenti similis sed griseo-albida.
- d) Testa grisea ad suturas non punctata.
- e) Testa griseo-castanea.
- f) Testa angustiore griseo-chalibæa.
- g) Testa omnino nigrescente.

LISTER CONCH., pl. 979, fig. 37.

Buccinum strigilatum, var. γ. GMEL. p. 3501.

AN EADEM Terebra luctuosa HINDS Thes. Conch., p. 481, pl. 45, f. 121?

Terebra Jamaicensis. C. B. ADAMS, Contrib. to Conch., 1850, n° 4, p. 58.

Hab. les Antilles.

Nous sommes étonné qu'une espèce si commune n'ait pas été mentionnée d'une manière claire et précise par M. Hinds, dans sa Monographie; deux espèces s'en rapprochent, mais nous semblent parfaitement distinctes. M. C. B. Adams compare sa coquille au *Terebra stylata* de Hinds, qui provient des mers de Chine et du Japon. La *Luctuosa* nous paraît plus rapprochée; elle est de la côte Ouest d'Amérique, et malheureusement la description et la figure de M. Hinds laissent des doutes sur l'identité des deux espèces. Celle-ci est allongée, étroite, subulée, très-variable dans ses couleurs, qui passent du blanc au jaunâtre, puis au gris, et du gris-clair jusqu'au noir par des nuances graduées. Les tours sont aplatis, conjoints, non divisés par un sillon; leur suture est accompagnée d'une fascie blanchâtre, sur laquelle se dessine, dans le plus grand nombre des individus, une série de ponctuations brunes. Des stries longitudinales, très-fines, commencent à la suture et viennent, en ondulant un peu, disparaître vers le milieu des tours. En examinant la surface à l'aide d'un grossissement suffisant, on la trouve couverte de ponctuations excessivement fines et disposées en séries transverses. Ce caractère se retrouve invariablement dans toutes les variétés, et sa constance nous a guidé pour réunir en une seule espèce des coquilles que nous aurions été porté à séparer à cause des différences de forme et de coloration; M. C. B. Adams a mentionné ce caractère, qui ne nous laisse aucun doute sur l'identité de son espèce avec les individus que nous devons à l'obligeance de M. le commandant Beau de la Martinique.

La longueur est de 60 mill. et le diamètre de 13.

DES 4 1257 p 20

TEREBRA JAMAIGENSIS. Shell not very slender, regularly tapering above the last whorl: slate colored, with a series of darker spots on a white spiral stripe next below the suture; with a white spiral line emerging from the top of the aperture, and a brown one from the middle of the same; white between the brown stripe and the columella: with longitudinal unequal wrinkles, which extend from the suture nearly to the middle of the whorls; with excessively minute lightly impressed spiral striæ: apex acute: spire with the outlines almost rectilinear: whorls twelve or thirteen, nearly plane: aperture long ovate: notch wide: columella slightly twisted. This species closely resembles the more slender *T. stylata* Hinds of the Philippine Islands. Mean divergence 16°; length 1.0 inch; breadth .43 inch.

Following is missing!



58. Terebra Jamaicensis, C. B. Ad. (= cinerea). Specimen

T. Jamaicensis C. B. Ad. = cinerea

Jamaicensis (Terebra), C. B. Adams. Contr. Conch., p. 58.

= T. cinerea, Born, 9/53. 31

TRYON 1835

73. T. jamaicensis, Adams, the same as T. cinerea, Born. 1860

73. TEREBRA JAMAIGENSIS, C. B. Adams.

Terebra jamaicensis, Lister, Conch. pl. 979. f. 37; C. B. Adams, Contr. to Conch. 1850, no. 4. p. 58.

Buccinum strigatum, var. γ, Gmel. p. 3501.

T. testa elongato-acuta, griseo-fuscescente vel nigrescente; anfractibus latis, contiguis, sutura lineari junctis, fasciola albidula aliquantisper irregulariter punctata ad suturam notatis, tenue plicatis, plicis in medio anfractuum evanescentibus, undique sub lente minutissime punctulatis; apertura angusta, superne alternata, basi dilatata, late emarginata; columella obliqua, atro-fuscescente, callo albo-flavescente, angulo acuto extus separata. Colore variabili.

Long. 60 mill., larg. 13.

Hab. La Jamaïque; toutes les Antilles.

DES 4 1259 p 20



JAMAICENSIS (2)

CB ADAMS 1850

233

= CINEREA



233d

BRAT 21

233d.

Lectotype of *T. jamaicensis* C. B. Adams, Natural Museum
Natural History, Washington No. USNM-6597; 30.6 mm.