

LAURINA
HINDS 1844
(233)
= CINEREA

TEREBRA LAURINA. *Ter. testâ elongatè subulatâ, acuminatâ, lævigatâ, politâ, olivaceâ; anfractibus planulatis, plicis tenuibus sinuosis, capillaribus, infrâ evanidis, supernè lineâ impressâ obsoletâ cinctis, ultimo unicolore, lævigato; aperturâ fuscâ; columellâ lævi, subtruncatâ. Axis 32 lin.*

Hab. Western Africa; in sandy mud: Rev. W. V. Hennis.
Cab. Cuming.

The impressed line is always faint, and sometimes not at all visible. The specimens are nearly of an uniform colour, but a band of somewhat deeper colour traverses the upper portion of each whorl.

H. 442 p 152



29. T. LAURINA. (pl. xlii. f. 27.) *Hinds*, l. c. p. 152.

Testâ elongatè subulatâ, acuminatâ, lævigatâ, politâ, olivaceâ; anfractibus planulatis, plicis tenuibus sinuosis, capillaribus, infrâ evanidis, supernè lineâ impressâ obsoletâ cinctis, ultimo unicolore, lævigato; aperturâ fuscâ, effusâ; columellâ lævi, subtruncatâ.

Shell elongated, subulate, acuminate, smooth, polished, of an olive colour; whorls flat, above indistinctly girdled, with numerous fine longitudinal folds. Aperture oval, effuse, brown within. Columella straight, naked, truncate. No canal.

Western Africa, in sandy mud: Rev. W. V. Hennis.

H. 446. T. C. p. 161 t. XLII f. 27

203
voir BOUCHET 1982 p 204.

Terebra laurina (HINDS).

1843. *Terebra laurina* HINDS, Proc. Zool. Soc. of Lond., p. 152.

1844. — — HINDS, SOWERBY, Thes. Conch., I, p. 161, pl. XLII, fig. 27.

Campagne de 1909-1910. Dragage Cotonou; dragage estuaire du Congo, près Banana.

Dispersion: Afrique Occidentale.

228 1913 p 6

76. TEREBRA LAURINA, Hinds.

Terebra laurina, Hinds, Thes. Conch. p. 161. no. 29, pl. 42. f. 27.
Hab. Côte occidentale de l'Afrique.

Si les échantillons que nous a communiqués M. Cuming, des trois espèces précédentes (*stylata*, *luctuosa*, *laurina*) sont bien identiques à ceux décrits par M. Hinds, il en résulterait qu'ils en diffèrent en rien d'essentiel du *T. jamaicensis* et devront lui être réunis; mais avant de prendre une décision définitive à ce sujet il serait nécessaire d'examiner de nouveau les types eux-mêmes figurés et décrits par Hinds.

DZS 1853 p 290

118. *laurina*, *Terebra* - HINDS, 1844, P. Z. S. L., p. 152.

Hab. Western Africa. Coll. Cuming. Size: 32 lin. (= 72.0 mm). Holotype no. 1968229: 67.6 mm; syntype: 63.0 mm.

C 69

76. *T. laurina*, Hinds, variety of *T. cinerea*, Born. KV 1910 b



63
T. laurina
Hinds
= *cinerea*

63. *Terebra laurina*, Hinds (= *cinerea*). Thes. Conch., f. 27.

Laurina (*Terebra*), Hinds. Proc. Zool. Soc., 1843, p. 152.
= *T. cinerea*, Born, . . . 31

TR 90 N 1985



233c

BRAT 27 233c. Lectotype of *T. laurina* Hinds, British Museum (N.H.) No. 1968229: 67.6 mm.