

Nuova *Hastula* (Terebridae) dalla Polinesia Umberto Aubry

Sistematica

Famiglia: Terebridae Mörch, 1852

Genere: *Hastula* H. & A. Adams, 1853

(Specie tipo: *Terebra strigilata* Linnaeus, 1758)

Hastula venus sp. n.

Materiale esaminato

N. 2 esemplari raccolti da subaquei a 10 m di profondità in sabbia nera vulcanica nel mare di Venus Point a Mahina, Tahiti nell'ottobre 1980.

Materiale tipo

Olotipo 13,11 mm x 2,68 mm - MMM Cupra Marittima

Paratipo 10,10 mm x 2,11 mm - Coll. dell'Autore

Località tipo

Tahiti Mahina Point Venus.

Distribuzione

Fino ad oggi conosciuta solo per la località di ritrovamento.

Descrizione

Piccola conchiglia di forma estremamente allungata, di aspetto fragile e translucida, la cui lunghezza varia da 13,11 mm a 10,10 mm e la larghezza da 2,68 mm a 2,11 mm. La protoconca è formata da 2 giri e la teleoconca da 10 giri il cui profilo è dritto. Il solco soprasuturale è ben marcato ma non delimita alcuna banda suturale essendo quest'ultima praticamente assente. I giri sono



Hastula venus olotipo

attraversati longitudinalmente da costole ben evidenti in numero di 12 per giro. Sono assenti strie e strutture spirali. Il colore è uniformemente grigio scuro negli esemplari studiati. La columella è dritta senza alcun segno di callo parietale e l'apertura è ovale e allungata.

Discussione

H. venus, ad una visione superficiale può facilmente venir confusa con altre *Hastule* a lei simili, in special modo *H. matheroniana* Deshayes, 1859 ma un attenta osservazione al microscopio evidenzia alcune caratteristiche conchigliologiche che le differenziano a livello specifico (vedi protoconca, columella, assenza di banda sottosuturale ecc.). Altre similitudini sono improponibili.

Derivatio nominis

Dalla località di ritrovamento.

2007-2008

ANNUARIO
MALACOLOGICO
EUROPEO

EUROPEAN
MALACOLOGICAL INDEX

ANNUAIRE
MALACOLOGIQUE
EUROPEEN

25 €



H. forticingulata
paratipo 1



H. forticingulata
paratipo 2