

203. *Terebra histrio* Deshayes, 1857

(Pl. 52, figs. 203a, b)

1857 *Terebra histrio* Deshayes, Journ. Conchyl. 6:76, pl. 4, fig. 11; 1977 Bratcher, Nautilus 91(2):41; 1983 Bouchet, Boll. Malac. 18(9-12):190, figs. 20-21.

Description: Shell to 48 mm; color creamy beige with large regularly spaced longitudinal brown spots, the subsutural band having tiny reddish brown fringelike lines; outline of whorls almost flat; protoconch of 1½ whorls; subsutural band noded on early whorls, nodes giving way to plications in middle whorls, then disappearing in later ones; band defined by a narrow subsutural groove; sculpture of curved axial striae and sometimes very fine spiral striae; body whorl short; aperture quadrate; columella recurved.



Type locality: None given. Senegal, West Africa, is here designated as the type locality.

Distribution: West Africa, from S. Morocco to Senegal, and to the Cape Verde Islands.

Type: Type lost. (Bouchet *pers. comm.*)

Discussion: This species was figured by Deshayes in 1857. Reeve (1860) and Tomlin (1944) both mention that the type is cited from the Deshayes collection but that the specimen in the Cuming collection is merely a form of *T. corrugata* (144). Neither Deshayes figure nor his description is that of *T. corrugata*, which has a much narrower shell, multispiral protoconch, and noded band.

B-203-1170



203a,b, *T. histrio* Deshayes. 203a, Type-figure from Deshayes, 1857, pl.4, fig.11; 48.0 mm. 203b, Near Cape Verde, West Africa; 47.0 mm. Zoological Museum, Copenhagen; dimensions unknown.

HISTRIO (2)
DESHAYES 1857

Terebra histrio DESHAYES, 1857: 76, pl. 4 fig. 11.

Localité type: « Habite? ».

Matériel type: L'holotype de Deshayes n'a pas été retrouvé dans la collection Deshayes (anciennement Ecole des Mines); il n'est pas non plus au British Museum.

Matériel examiné: Presqu'île du Cap-Vert, de 15 à 95 m, 5 spms + coqs. (Marche-Marchad coll.); NW du Cap Barbas, Maroc, 56-58 m, 9 spms + coqs (LEWY 1975 sous le nom de *T. senegalensis*); et 4 autres nds. sans localités précises.

Distribution: du Sud marocain au Sénégal, circalittoral.

Remarques: *T. histrio* est le descendant de *T. postneglecta* SACCO du pliocène italien; c'est une espèce sans larves planctoniques et le plus septentrional des *Terebridae* ouest-africains.

On reconnaît *histrio* à sa sculpture axiale présente seulement sur les 5 ou 6 premiers tours; les autres tours sont ornés de fortes stries de croissance et d'une fine sculpture spirale sous le cordon sous-sutural. L'ouverture est courte avec un canal étroit. Les grandes flammules brun rouge se détachent nettement sur fond beige crème (alors qu'elles sont indistinctes chez *senegalensis* et absentes chez *concinna*). *T. corrugata* a un profil beaucoup plus étroit, une protoconque multispirale et des nodosités toujours nettes dans la bande sous-suturale.

BOUCHET 1983

182. *TEREBRA HISTRIO*, Desh. p 308

T. testa elongato-subulata, crassiuscula, pallide albo-lutescente, maculis longitudinalibus fusco-castaneis subundatis picta, ad suturas lineis rufo-rubrescentibus fimbriata, maculis in ultimo anfractu ad peripheriam interruptis; anfractibus numerosis, angustis, planis, sulco divisis; margine suturali plano, in primis anfractibus granuloso, in alteris plicato; ultimo anfractu basi depressiusculo; apertura angusta, parum obliqua, subquadrata, canali brevi, contorto terminata; columella alba, brevi, valde contorta.

Long. 48 mill., larg. 11.

Hab. — ?

Ma Collection.

DESH 1857 p 308


182. *T. histrio* Desh. *J. Conchyl.*, vi, 76, pl. iv, f. 11. Hab. ? Type given as in "ma collection", but there is one in the Mus. Cuming, which is merely a short, stumpy form of *corrugata*.

T 44

TYPE IN ECOLE DES MINES ? (T-44)

Terebra histrio Deshayes, 1857. Figured by Deshayes. Type locality unknown. Reeve and Tomlin both mention that the type is cited from the Deshayes collection but that there was one in the Cuming collection which is merely a form of *T. corrugata* Lamarck, 1822. Neither Deshayes' description nor his figure is that of *T. corrugata*. No specimen found in the Deshayes collection. p 41

BLANCHER 72 VOL 92(2) 41



20, *T. histrio*, Sénégal; 51 mm. -
21, *T. histrio*, Sud de Gorée, Sénégal. 42 m; 36 mm

11. *TEREBRA HISTRIO*. Desh. (Pl. IV, fig. 11.)

p 76

T. testa elongato-subulata, crassiuscula, albo pallide lutescente, maculis longitudinalibus fusco-castaneis subundatis picta; ad suturas lineis rufo-rubrescentibus fimbriata; maculis in ultimo anfractu ad peripheriam interruptis; anfractibus numerosis, angustis, planis, sulco divisis; margine suturali plano, in primis anfractibus granuloso, in alteris plicato; ultimo anfractu basi depressiusculo; apertura angusta, parum obliqua, subquadrata, canali brevi, contorto, terminata; columella alba, brevi, valde contorta.

Habite.... ?

Très-belle espèce dont nous ne connaissons que le seul exemplaire de notre collection; elle se rapproche un peu du *Flammea* DE LAMK. par sa coloration, mais elle est plus petite, allongée, conique, très-pointue au sommet; elle est formée de 17 tours étroits, aplatis, partagés en deux parties inégales par un sillon transverse, la portion marginale prend plus du tiers de la largeur totale de chaque tour. Dans le jeune âge, le bourrelet est élégamment granuleux; sur le milieu de la coquille, les granulations sont remplacées par des plis crénelés qui disparaissent presque entièrement sur les derniers tours. Le dernier tour est court, déprimé à la base; l'ouverture est courte, subquadrangulaire, un peu oblique; elle se termine par un canal assez long, fortement contourné et profondément échancré; la columelle est blanche et fortement tordue sur elle-même. Sur un fond d'un blanc jaunâtre très-pâle, cette coquille est ornée sur le milieu des tours de grandes taches longitudinales, d'un beau brun foncé, assez régulièrement espacées, sur le dernier tour elles remontent jusqu'à l'origine du canal terminal, mais elles sont interrompues à la circonférence. Sur le bourrelet marginal se montrent de petites lignes rougeâtres qui simulent une frange.

Cette coquille a 48 millim. de long et 11 de diamètre. Ma collection.

DESH 1857 p 76



11

TEREBRA HISTRIO Deshayes

Deshayes a décrit cette belle espèce en 1857 (Jour. de Conchyl., VI, p. 76, pl. IV, fig. 11) sur un échantillon unique (long de 48 mm.) dont il ignorait la provenance. Reeve (1860, Conch. Icon., pl. XII, fig. 46) en a signalé un second spécimen, d'habitat inconnu également (collection Cuming). Pour Tryon (1885, Man. Conch., VII, p. 26, pl. 7, fig. 29), qui ne fait que citer Deshayes, cette espèce est toujours d'habitat inconnu.

Or la collection du Muséum en possède deux spécimens. L'un, mesurant 52 mm., n'a pas de provenance, mais l'autre, de 42 mm. (collection Jousseau) est marqué de Gorée.

D'autre part M. Nicklès en a récolté un exemplaire long de 58 mm., dans des matériaux de remblaiement dragués dans le port de Dakar.

Il est donc établi que cette espèce habite le Sénégal.

FISCHER-PICOTE & NICKLÈS 1946 (2)



T. histrio Desh.

Histrio (Terebra), Desh. Proc. Zool. Soc., 1859, p. 308; Jour. Conch., 1857, p. 76, pl. iv, f. 11, . . . 26

T. HISTRIO, Desh. Pl. 7, fig. 29.

Yellowish, with waved longitudinal chestnut stripes, interrupted at the periphery; longitudinally striate, the striæ becoming plications upon the sutural band, where the surface is variegated with chestnut lines. Length, 45 mill. TRYON 1885 p. 26 Hab. unknown.

29. Terebra histrio, Desh. Ibid., t. 4, f. 11,



46.

Species 46. (Mus. Deshayes.)

TEREBRA HISTRIO. Ter. testâ subobeso-subulatâ, albolutescente, maculis longitudinalibus castaneo-purpureis undatis pictâ, juxta suturam lineis purpureo-rufis fimbriatâ, maculis in anfractu ultimo ad peripheriam interruptis, anfractibus subplanulatis, sulco divisis, ad marginem crenato-granatis, granis ætate producentibus; aperturâ parvâ, columellâ brevi, abruptè valdè contortâ.

THE HARLEQUIN TEREBCRA. Shell rather stoutly subulate, whitish yellow, painted with longitudinal waved chestnut-purple spots, next the suture filled with purple-red lines, spots in the last whorl interrupted at the periphery, whorls rather flat, divided by a groove, crenately grained at the margin, grains lengthening with age; aperture small, columella short, abruptly much twisted.

DESHAYES, Pro. Zool. Soc. 1859, p. 308.

Hab. — ?

This species, from the collection of M. Deshayes, and of which Mr. Cuming also possesses an example, belongs to the same type as *T. corrugata*, from which it differs in being more obtuse and smooth, and in being composed of much fewer whorls.

RV1960