

TEREBRA *Hupei*. (Pl. XII, fig. 1.)

Testa pyramidata, albida, maculis rufis, subquadratis, in series transversim dispositis, et punctis purpureis, praesertim propè suturam, ornata; longitudinaliter minutè striata, et obtusè costata; transversim sulcata; infra suturam tuberculosa; tuberculis longitudinalibus in medio subcarinatis; columella contorta; canali brevi; margine dextro subsinuoso; pagina interna rufo-bizonata.

Longueur. . . . . 65 millimètres.

Largeur. . . . . 16 millimètres.

Hab. ? (Ma Collection.)

Observ. Cette belle espèce, dont nous ne connaissons que l'exemplaire qui appartient à notre collection, est un peu plus ventrue que la plupart de ses congénères. Elle est d'un blanc grisâtre, ornée de taches subquadrangulaires qui ne se prolongent pas jusqu'à la suture. Celle-ci est blanche, profonde; le sommet des tours est formé par un bourrelet blanc parsemé de taches pourpre, portant des tubercules irréguliers, et séparé du tour par un sillon profond. Columelle et canal recourbés. Intérieur de la coquille présentant deux zones transverses brunes, sur un fond blanc, 12 à 14 tours de spire.



HUPEI  
Lorois 1857 (152)  
= VARIEGATA

Lorois 1857 p 388

183. TEREBRA HOPEI, Lorois. → HUPEI!

*Terebra hopei*, Lorois, Journ. de Conch. 1857, p. 388, pl. 12. f. 1.

Hab. — ?

DESA 1859 p 309

183. *T. hupei*, Lorois, the same as *T. variegata*, Gray. RV 1760b



5. *T. Hupei* Lorois = *variegata*

5. *Terebra Hupei*, Lorois (= *variegata*). Ibid., t. 12, f. 1,

*Hupei* (*Terebra*), Lorois. Journ. de Conch., 2d ser., ii, p. 388 (1857), pl. xii, f. 1. = *T. variegata*, Gray, 1845. 14

TRAYON 1875