

KNORRII

GRAY 1834 (16)

CHLORATA

TEREBRA KNORRII. *Ter. testâ turrîtâ, subulatâ, acuminatâ, solidâ, politâ; anfractibus planis, superioribus transversè sulcatis; albâ brunneo interruptè trifasciatâ, fasciâ posteriore latâ maculis irregularibus, medianâ angustâ, anteriore latiore maculis quadratis.*

Axis $2\frac{1}{2}$, diam. $\frac{1}{2}$ unc.

Knorr, *Deliciæ*, vol. iii. t. 23. f. 3.

This species differs from *Ter. maculata* by being more slender, and by having the front of the whorls spotted. From *Ter. tigrina* it is distinguished by the marbling of the back of the whorls. 6-34 p 59

TEREBRA KNORRII, Gray, Proc. Zool. Soc. 1834, p. 61.

Double emploi du *Terebra chlorata*, Lamk. DESH 1817 p 318

113. *knorrii*, *Terebra* - GRAY, 1834, P. Z. S. L., p. 59.

Hab. ? Size: $2\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ " (= $63\frac{1}{2} \times 12.7$ mm). Holotype: 62.7 mm. = *T. chlorata* LAMARCK, 1822. C69

Knorri (*Terebra*), Gray. Proc. Zool. Soc., 1834, p. 59.

= *T. chlorata*, Lamk. 11

TRAYON 1885

T. KNORRII. -- *Têt.* Dans le vieil âge, l'extrémité postérieure détériorée. Point de drap marin.

Opercule. Comme celui du *T. maculata*.

Mœurs. Ce Mollusque habite les fonds de sable dans lequel la vase domine, à la profondeur d'environ 2 mètres, et où croissent quelques plantes marines. Nourriture chair morte.

Localité. Les Amirantes. Très rare. DUFO 1840 p 66