

LÆVIS

GRAY 1834

8

= GUTTATA

TEREBRA LÆVIS. *Ter. testâ turritâ, subulatâ, lævi; anfractibus subconcavis, in medio subearinatis, superioribus transversè sulcatis, cingulo albo opaco angusto lævi sulco subprofundo anticè porcâque angustissimâ carinatâ posticè aucto; albâ flavescente variâ.*

Axis 1 1/4 unc.

G 34 p 6

107. T. LÆVIS, Gray, l. c. p. 61.

After repeated examinations of the very miserable specimen which has been described under this name, I feel satisfied that it is only the worn apex of either *T. muscaria*, or *T. oculata*, which in an early state are much alike.

H 446 T. c. p 185

63. TEREBRA LÆVIS, Gray, l. c. p. 61.

Hab. —? (v. s. in m. Gray.)

At first I was somewhat struck with the peculiar appearance of the specimen, but after repeated examination and comparison I feel satisfied that it is the worn apex of either *T. muscaria* or *T. oculata*, which are in this state much alike.

H 442 p 163

TEREBRA LÆVIS, Gray, Proc. Zool. Soc. 1834, p. 61.

M. Hinds affirme qu'après l'avoir examinée il a trouvé cette espèce faite avec un misérable specimen de la *T. muscaria* ou de l'*oculata*.

DESH 1859 p 318

116. *laevis*, *Terebra* - GRAY, 1834, P. Z. S. L., p. 61. *Hab.*

? Size: 1 1/4" (= 31.7 mm). Probable holotype no.

74.11.10.10: 34.3 mm. = *T. cingulifera* LAMARCK,

1822.

C 69

Lævis (*Terebra*), Gray. Proc. Zool. Soc., 1834, p. 61; Desh., Zool. Proc, 1859, 318, 40

T. LÆVIS, Gray. Worn and indeterminate. 72401 85140