

Terebra luandensis sp.n.**Materiale esaminato**

Numero 7 esemplari dragati a circa 15 m di profondità in substrato di fango e sabbia nel mare di Farol das Lagostas a nord di Luanda, Angola.

Materiale tipo

Olotipo 14,51 mm x 3,48 mm - MMM Cupra Marittima
 Paratipo 1 13,63 mm x 3,09 mm - Coll. dell' Autore
 Paratipo 2 12,84 mm x 2,84 mm - Coll. dell' Autore
 Paratipo 3 11,65 mm x 2,93 mm - Coll. dell' Autore
 Paratipo 4 11,45 mm x 2,92 mm - Coll. dell' Autore
 Paratipo 5 10,50 mm x 2,66 mm - Coll. dell' Autore
 Paratipo 6 9,83mm x 2,30 mm - Coll. dell' Autore

Località tipo

Farol das Lagostas, Angola.

Distribuzione

conosciuta fino ad oggi solo per la località di ritrovamento.

Descrizione

Conchiglia di piccole dimensioni. L'altezza varia da 14,51 mm a 9,83 mme la larghezza all'ultimo giro da 3,48 mm a 2,30 mm. Il colore è marrone chiaro tranne che alla periferia del giro corpale che è più scuro. La protoconca, paucispirale, è formata da 1,5 giri e la teleoconca da 7-8 giri il profilo dei quali è leggermente convesso. La sutura, al quanto profonda, delimita anteriormente la banda sottosuturale, la scultura della quale è formata da costole robuste che sono il prolungamento delle costole dei giri che si contano in numero di 8-9. Non si apprezzano strie spirali l'apertura è quadrata e la columella dritta.

Discussione

La diversità della protoconca paucispirale nell'una e multispirale nelle altre due che più si possono prendere in considerazione dal punto di vista tassonomico e cioè *T. reticularis* e *T. gray*, è un carattere distintivo insieme alla forma dell'apertura e all'assenza di struttura spirale, che la differenzia a livello specifico. Anche alcuni caratteri ben evidenti

quali la scultura assiale, la banda sottosuturale e la columella ne fanno 2 specie distinte.

Derivatio nominis

Località di ritrovamento.



T. luandensis olotipo e paratipo 1