

21. *TEREBRA MARGINATA* Desh. (Pl. IV, fig. 8.)

1866

*T. testa conica, turrata, acuminata, griseo-plumbea, basi anfractuum albo marginata, fusco irregulariter maculata; anfractibus latis, sulco divisis, longitudinaliter costellatis, transversim tenuis striatis; margine suturali crasso, convexo, albo, nodulis crassis, acutis, asperato; ultimo anfractu basi obtuso, transversim sulcato, zonula alba notato; apertura elongato-angusta, intus castanea, labro linea alba bipartito; columella contorta, subplicata.*

Hab. l'embouchure de la Gambie.

Par sa forme générale, cette espèce rappelle un peu le *Terebra interstincta* de Hinds, dont elle se distingue, du reste, par tous les caractères spécifiques; celle-ci est courte proportionnellement, assez large à sa base. Ses tours, au nombre de douze, sont larges, aplatis et dominés par un bourrelet marginal, gros, épais, blanc, sur lequel s'élèvent de gros tubercules, dans l'intervalle desquels se place une tache brune; de petites côtes longitudinales occupent le reste de la surface et leur épaisseur augmente à mesure qu'elles montent vers la partie supérieure des tours; elles sont traversées par cinq à six stries fines, transverses, régulières, également distantes; sur la base du dernier tour elles deviennent plus grosses et plus irrégulières. Une zone blanchâtre à la circonférence partage le dernier tour; elle se répète à l'intérieur de l'ouverture; celle-ci est d'un beau brun; elle est oblongue, étroite, son canal est court, terminé par une échancrure étroite et peu profonde. La columelle est tordue, subplissée, blanche à la base, brune en avant.

Cette espèce a 3/4 mill. de long et 8 de diamètre.

Collection de M. Cuming. DESH 1857 p 86



MARGINATA  
DESH 1857  
(156)  
= ARMILLATA

109. *TEREBRA MARGINATA*, Desh.

*T. testa conica, turrata, acuminata, griseo-plumbea, basi anfractuum albo marginata, fusco irregulariter maculata; anfractibus latis, sulco divisis, longitudinaliter costellatis, transversim tenuis striatis; margine suturali crasso, convexo, albo, nodulis crassis acutis asperato; ultimo anfractu basi obtuso, transversim sulcato, zonula alba notato; apertura elongato-angusta, intus castanea, labro linea alba bipartito; columella contorta, subplicata.*


Long. 34 mill., larg. 8.

Hab. L'embouchure de la Gambie.

Collection Cuming.

DESH 1857 p 296

109. *T. marginata*, Deshayes, variety of *T. variegata*, Gray. RV 1860b



156b

156b, Lectotype of *T. marginata* Deshayes, British Museum (N.H.) No. 197966; 34.0 mm.

BRAT 87

33. *marginata*, *Terebra* - DESHAYES. 1857, J. C. P., 6: 86, pl. 4, fig. 8. Hab. L'embouchure de la Gambie. Coll. Cuming. Size: 34x8 mm. Holotype: 34.0 mm (marked x inside aperture); syntype: 29.6 mm. The locality indication of Gambia appears to be erroneous, since the types are coarsely sculptured *T. armillata* HINDS, 1844. C69



38  
*T. marginata*  
Desh.  
= *variegata*

38. *Terebra marginata*, Desh. (= *variegata*). Jour. de Conch., 2d ser., ii, t. 4, f. 8. Marginata (*Terebra*), Desh. Jour. Conch., 1857, p. 86, pl. iv, f. 8. = *T. variegata*, Gray, 1857 p 38. 15

109. *T. marginata* Desh. J. Conchyl., vi, 86, pl. iv, f. 8. Gambia. Type B.M. = *T. interstincta* Hinds. 744

TRAYON 1885