



16. T. Oculata. (pl. xlii. f. 31.) Lamarck, l. c. v. vii. p. 286.

Testâ elongatè subulatâ, turrîtâ, pallidè fulvâ; anfractibus subplanulatis, lineâ impressâ divisâ, supernè subtumidis, maculis albis subdistantibus cinctis, ultimo subquadrato biserialim maculato; aperturâ subquadratâ; columellâ contortâ, acutâ, albidâ, breviter canaliculatâ; epidermide tenui indutâ.

Shell elongated, subulate, acuminate, turrited, smooth, of a fawn colour; whorls girdled, the impressed line not being very perceptible on the inferior whorls; above tumid, and ornamented with a series of roundish white spots, placed somewhat distant and doubled on the last whorl; aperture squarish, and with a short but decided canal; columella naked, twisted, and with a sharp margin. A thin epidermis covers many individuals.

Pomoutou and Society Islands, in the South Pacific; Moluccas.

H. 443 T.C. p 156 t xlii f 31

Oculata (1)  
LAM 1822  
DILLWYN 1817  
8  
= GUTTATA

16. TEREBRA Oculata, Lamarck, l. c. vol. vii. p. 286.  
Hab. Bow Island; Society Islands; Amboina: H. 1442 p 164

173. TEREBRA Oculata, Lamk.  
Terebra oculata, Kiener, Icon. des Coq. Viv. p. 11. no. 7, pl. 4. f. 7.  
Hab. Moluques; Iles de la Société, Océan Pacifique.  
DESH 1855 p 207

Terebra (s. str.) oculata (DILLWYN) LAMARCK = GUTTATA Desh. 1798

1780. Turbo ex albo maculatus et oculatus, CHEMNITZ, Conch. Lab., IV, p. 290, pl 153, fig. 1442.

1787. Strombus varius, MEUSCHEN, Mus. Geversianum, p. 294.

1790. Buccinum maculatum var. γ, GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3499.

1793. Buccinum maculatum var. a, SCHREIBERS, Conch., I, p. 167.

1798. Epitonium Guttatum, RÖDING, Mus. Boltenianum., p. 14, n° 1214.

1817. Buccinum oculatum, DILLWYN, Descr. Catal., II, p. 642.

1822. Terebra oculata, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 286.

REMARQUE. — Le nom oculata, généralement attribué à Lamarck, avait déjà été employé binominalement par Dillwyn, qui l'avait emprunté à des auteurs anciens. C'est un des Terebra les mieux caractérisés par les grandes taches blanches qui ornent le sommet de ses tours. Tryon a considéré le Terebra nebulosa Lorois (non Sowerby), comme l'état jeune du T. oculata qui ne lui ressemble cependant ni par sa forme, ni par sa sculpture, ni par son dessin.

T. Oculata Lamk. — Têt. Presque toujours la partie postérieure terne et détériorée.

Opercule. Comme le précédent.  
Mœurs. Comme le précédent.  
Localité. Comme le précédent. D. F. O. 1240 p 67

7. Vis oculée. Terebra oculata. Lamk. p 242

T. testâ turrîto-subulatâ, peracutâ, lævigatâ, pallidè fulvâ, infra suturas maculis albis rotundatis unâ serie cinctâ; anfractibus supernè convexis, ferè marginatis, infernè planulatis.  
Rumph. Mus. t. 30. fig. D.

- Petiv. Amb. t. 2. f. 4.
  - Seba. Mus. 3. t. 56. f. 11.
  - Favanne. Conch. pl. 40. fig. Z.
  - Buccinum maculatum. Var. Schrot. Einl. in Conch. 1. t. 2. f. 6.
  - Martini. Conch. 4. t. 153. f. 1442.
  - \* Buccinum maculatum. Var. γ Gmel. p. 3499.
  - \* Buccinum oculatum. Dillw. Cat. t. 2. p. 642. n° 133.
  - \* Wood. Ind. Test. pl. 24. f. 130.
  - \* Desh. Encycl. méth. Vers. t. 3. p. 1130. n° 7.
  - \* Kiener. Spec. des Coq. p. 11. n° 7. pl. 4. f. 7.
  - \* Küster. Conch. Cab. p. 13. n° 11. pl. 2. f. 9.
- Habite l'Océan des Grandes-Indes et des Moluques. Mon cabinet. Jolie espèce, bien caractérisée par ses taches oculaires, et à spire très aiguë, blanche vers son sommet. Longueur: 3 pouces 4 lignes trois quarts. D 29 E 1840 p 242

TEREBRA Oculata Lamarck.


- 1822. Terebra oculata LAMARCK, Anim. s. vert., VII, p. 286.
- 1885. — — Lam., TRYON (pars), Man., VII, p. 10, pl. 2 fig. 20 (tantum).

Localités. — Iles Société (Cuming); Raiatea!; Moorea!; Anaa (Cuming).  
Le T. nebulosa Lorois (non Sow., nec Kiener), devenu T. Loroisi Desh., iniqué par Tryon comme synonyme, est, à notre avis, une espèce bien spéciale.  
D 20 F 86 1933 p 68

7. Vis oculée. Terebra oculata.

T. testâ turrîto-subulatâ, peracutâ, lævigatâ, pallidè fulvâ, infra suturas maculis albis rotundatis unâ serie cinctâ; anfractibus supernè convexis, ferè marginatis, infernè planulatis.

- Rumph. Mus. t. 30. fig. D.
  - Petiv. Amb. t. 2. f. 4.
  - Seba, Mus. 3. t. 56. f. 11.
  - Favanne, Conch. pl. 40. fig. Z.
  - Schroëttter, Einl. in Conch. 1. t. 2. f. 6.
  - Martini, Conch. 4. t. 153. f. 1442.
- Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluques. Mon cabinet. Jolie espèce, bien caractérisée par ses taches oculaires, et à spire très-aiguë, blanche vers son sommet. Longueur, 3 pouces 4 lignes trois quarts. LAM 1822 p 286



OCULATA (2)  
 LAMARCK  
 DILLWYN 1817  
 8 GUTTATA

TEREBRA OCULATA. *Ter. testá elongato-turrilá, solidiusculá, fulvescente-spadiceá, maculis grandibus albis uniserialim, ad basin biserialim, cinctá, anfractibus primis crenulatis, deinde laticibus, infra planis, supra tumidis; columellá subcontortá.*

THE EYED TEREBRA. Shell elongately turreted, rather solid, fulvous-fawn, encircled with a row, at the base with two rows, of large white spots, whorls, the first crenulated, then smooth, flat below, swollen above; columella slightly twisted.

LAMARCK, Anim. sans vert. vol. x. p. 242.

*Terebra levis*, Gray.


*Terebra nebulosa* Lorois (*T. Loroisii* Deshayes)  
 Hab. Isle of Annaa, Society Islands (in sand, on coral reefs, at low water); Cuming.

There is no species of the genus in which there is so little variation either of form or colouring as in this. In dwarf specimens the white spots are often obscure.

R. 1860

Sp. 18. *T. oculata*.—Add as synonym


*T. nebulosa*, Lorois (*T. Loroisii*, Deshayes).



18.



*T. oculata*, 20



38. *Terebra oculata*, Lamarck, 37, XII. IX. <sup>1817</sup> ~~1819~~ <sup>1817</sup> ~~1819~~

7. VIS OCULÉE. *Terebra oculata*, LAM.

(Collect. MASS. LAM.) RUMPH., Mus., t. 30, fig. d.

Pl. IV, fig. 7.

*T. testá turrito-subulatá, peracutá, levigatá pallidè fulvâ, infra suturas maculis-albis rotundatis unicâ serie cinctá; anfractibus supernè convexis, ferè marginatis, infernè planulatis.*

Coquille allongée, fort étroite, très-aiguë au sommet, formée par un grand nombre de tours de spire à peine convexes, légèrement renflés à leur sommet; sur les premiers tours ce renflement se change en deux petits bourrelets assez saillants, finement crénelés. La suture est simple et superficielle; l'ouverture est petite, subquadrangulaire, plus haute que large, d'un fauve mêlé de blanc; le bord droit est mince et tranchant, sinueux dans sa longueur; la columelle est courte, cylindracée, tordue et munie au dehors, à son origine, d'une petite carène obliquement décurrente. Toute cette coquille est d'un fauve orangé, ornée, sur le renflement des tours, de taches blanches arrondies, d'une grande régularité; une rangée de taches semblables se remarque vers la base du dernier tour.

Long. 5 pouc.

Habite l'Océan Indien.

Cette jolie espèce est bien caractérisée par les taches oculaires qui en bordent la suture, et par son extrémité supérieure qui est très-aiguë, blanche et crénelée. KN 1832-39-11

7. N. Oculée. (*T. oculata*).

20. *Terebra oculata*, Lam. Sowb., Thes., f. 31,

*T. OCULATA*, Lam. Pl. 2, fig. 20; Pl. 3, fig. 36.

Orange-brown, with a row of large white spots just below the sutures, and a second row below the middle of the body-whorl; whorls somewhat constricted in the middle.

Length, 3.5-5 inches.

TRYON 95 p 10 Moluccas—Viti Islands.

According to Reeve, who has seen the type, *T. nebulosa*, Lorois (fig. 36), is the young of the species; the name being pre-occupied, Deshayes changed it to *T. Loroisii*.

*Oculata* (*Terebra*), Lam. Anim. s. Vert, x, p. 242, pl. 2, fig. 20

TRYON 1885

4. *Terebra oculata* Lamarck.

LAMARCK. An. s. vert. Éd. II, Vol. X, p. 242.

RUMPH. Amb. Rariteitkamer, p. 100, Pl. 30, fig. D.

KIENER. Coq. Viv. Vol. VIII, *Terebra*, p. 11, Pl. 4, fig. 7.

KÜSTER. Martini-Chemn. Conch. Cab. Ed. II, Vol. V, *Terebra*, p. 13, Pl. 2, fig. 9.

SOWERBY. Thes. Conchyl. Vol. I, p. 156, Pl. 42, fig. 31.

TRYON. Man. of Conch. Vol. VII, p. 10, Pl. 2, fig. 20.

Stat. 234. Nalahia-bay, Nusa-Laut-island. Reef. 2 Spec.

SEMPER 130 6367


OCCULATA(3)  
 DILLWYN 1817  
 (8) GUTTATA

OCULATUM. 133. Shell turreted, sub-fusiform, with the upper half of the whirls convex and ocellated.

*Buccinum maculatum*, Var. *Schroeter* Einl. i. p. 349. t. 2. f. 6. *Gmelin*, p. 3499. *Schreibers Conch.* i. p. 167. *Rumphius*, t. 30. f. D. *Petiver Amb.* t. 2. f. 4. *Seba*, iii. p. 56. f. 11. *Martini*, iv. t. 153. f. 1442. *Favanne*, t. 40. f. Z.

Inhabits the East Indian Seas. *Martini*.  
 Shell from three to six inches long, and about one-fifth as broad, of a pale chestnut-colour, with a row of large white spots on the tumid upper part of the whirls; the whirls are more numerous than in *B. maculatum*, and it is a perfectly distinct species. It is well figured in Martyn's Univ. Conchology, but I cannot ascertain the number of the plate.

DILLWYN 1817 p. 642



*Terebra (Myurella) oculata* Lam. Chemn. IV. Fig. 1942. Kien. Fig. 7. Reeve Fig. 18. *Buccinum ornatum* Martyn univ. conch. pl. 92. Dujo 67 Seychellen. Licn. 29 Mauritius. MARTINS 1880 p. 231

2. *Terebra oculata* Lamarck HIRASE 34  
 Height 135 mm.; diam. maj. 25 mm., m'n. 24 mm.

2. *Terebra oculata*. Lam. T. 42. f. 11.  
 Das thurmpfriemenförmige, spitzige, geglättete, blaß braungelbe Gehäuse hat unter den Rippen eine Reihe weißer, runder Flecken. Die Umgänge sind oben conver, fast gerändert, nach unten gebogen. Wird 3 1/2 Zoll groß. Ostindien.  
 Dfen, V. 1. 469. — Cuvier, übersetzt von Voigt. III. 350. — Cuvier, Räg. anim. pl. 56. L. 1.  
 Kiener, 11. pl. 4. f. 7. — Rumph, T. 30. f. D. BERGE 1851 p. 248