

Var. *pallida* nov. var.

1767. *Strombus 3 Rumph*, PETIVER, Anim. Amboin., p. 3, pl. XIII, fig. 17.  
1795. *Buccinum hecticum*, CHEMNITZ (non Linné), Conch. Cab., XI, p. 95, pl. 188, fig. 1817, 1818.  
1822. *Buccinum Hecticum*, WOODARCH (non Linné), Study of Conch., p. 95.  
1837. *Terebra dimidiata* Lam., KIENER, Icon. Coq. viv., p. 6, pl. 2, fig. 2<sup>a</sup>.  
1841. *Terebra hectica*, KÜSTER (non Linné), Conch. Cab., 2<sup>e</sup> édit., p. 13, pl. 3, fig. 9, 10.  
1844. *Terebra dimidiata*, HINDS in SOWERBY, Thes., I, p. 153, pl. XLI, fig. 8.  
1887. *Terebra dimidiata* var. *hectica* Chtz., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 250.  
1902. *Terebra chlorata*, VON MARTENS (non Lamarck), Rumphius Gedenkboek, p. 120.

REMARQUE. — Cette variété qu'on rencontre aussi fréquemment que le type, a le dessin de la variété *circumvoluta*, mais la nuance du fond, au lieu d'être rouge est d'une teinte carnéolée ce qui donne à la coquille un aspect très pâle.

D'après Gmelin et Jay, le *Buccinum ferrugineum* Born, serait une variété du *T. dimidiata*, mais Deshayes l'a regardé comme une variété du *T. faval* Adanson = *senegalensis* Lamarck, et cette opinion est confirmée par l'examen de la figuration de Born qui montre que sa surface est entièrement couverte de stries axiales fines et serrées comme celle du *T. faval*, tandis que celle du *dimidiata* est presque tout à fait lisse et très luisante.

Le *Terebra splendens* Deshayes (Journ. de Conchyliologie, VI, 1857, p. 73, pl. V, fig. 11) que Tryon a cité comme variété du *dimidiata* se distingue assez de cette espèce par sa forme plus allongée, ses tours supérieurs plus finement sculptés, etc., pour maintenir sa séparation spécifique.

DZB 1935 b23

PALLIDA 1  
DZB 1935 (10)  
= DIMIDIATA