



19. *Terebra pallida* DESHAYES. 30 metres, Gulf of Papua. Pacific Ocean range. Scarce. A uniform tan colour; low sutural band; axial folds at the sutures, and spiral grooves. Averages 65 mm.

HINTON, 48

SEE PUNCTATOSTRIATA  
CERNOHORSKY & BRATCHER  
1976

PALLIDA (1)  
DESHAYES  
1857 (24)  
= PUNCTATOSTRIATA  
= PUNCTATOSTRIATA

25. *Terebra punctatostriata* Gray, 1833

(figure : 27)

Nous avons retenu *T. punctatostriata* dans cette révision, tout comme RICHARD, 1982, bien que l'espèce n'ait pas été récoltée récemment. En effet, la localité type de *T. pallida* Deshayes, 1857 (qui est un synonyme de *T. punctatostriata*) est : « îles Marquises ». L'espèce présente diffère de *T. cingulifera*, avec laquelle elle a été longtemps confondue, par sa couleur plus foncée, des tours plus convexes et une bande sous-suturale à peine visible sur le profil. Taille moyenne adulte : 4 cm.




Figure 27 : *Terebra punctatostriata* Gray, 1833

- 10 : Holotype, British Museum : 70 mm
- 11 : Lectotype de *Terebra pallida* Deshayes, qui est synonyme (British-Museum) : 71,8 mm.
- 12,13 : spécimen de Natadolz, Fiji, 98 mm. (Photo CERNOHORSKY et BRATCHER). X15

*Terebra pallida* Deshayes, 1857  
(Plate 51. Figure 382.)

*exulta* Iredale, 1931.

SHELL: Reddish-brown to tan throughout, whorls number 20-26. Sculptured with very weak axial ribs which are confined to the sutures, 4-8 smooth spiral grooves and a spiral groove at sutures; early whorls bear a double row of nodules at suture.

SIZE: Three to four inches.

DISTRIBUTION: Tropical Pacific. Moderately rare. C 1967



TEREBRA PALLIDA  
(Deshayes, 1857) 80  
mm. - Australia, Pol-  
nesia, Fiji. In aqua  
bassa. \*\*

AVS24 pl 2

147. *pallida*, *Terebra* - DESHAYES, 1857, J. C. P, 6: 87, pl. 4, fig. 3. Hab. Les îles Marquises. Coll. Cuming. Size: 72x11 mm. Holotype: 71.8 mm; syntypes: 59.2 mm (erroneously marked with x inside aperture), and 51.9 mm. The holotype is the same species as *T. punctatostriata* GRAY, 1834; the two smaller syntypes are *T. cingulifera* LAMARCK, 1822. C69

197. *T. pallida* Desh. *J. Conchyl.*, vi, 87, pl. iv, f. 3. Marquesas Is. Types (3) B.M. = *cingulifera* Lam. T44

197. TEREBRA PALLIDA, Desh.

*T. testa elongato-angusta, acuminata, subulata, omnino flavo-aurantia; anfractibus numerosis, angustis, primis planis, ultimis convexiusculis, sulco divisus, transversim tenue striatis, striis incisus, inaequaliter distantibus; margine suturali simplici, vix distincto; ultimo anfractu elongato, basi attenuato, tenuiter et obsolete striato; apertura elongata, angusta, canali longo, recto terminata, late profundeque emarginata; columella cylindraco-conica.*

Long. 72 mill., larg. 11.

Hab. Les Iles Marquises.

Collection Cuming.

DESH 1857 p 311

22. TEREBRA PALLIDA Desh. (Pl. IV, fig. 3.)

p 87

*T. testa elongato-angusta, acuminata, subulata, omnino flavo-aurantia; anfractibus numerosis, angustis, primis planis, ultimis convexiusculis, sulco divisus, transversim tenue striatis; striis incisus, inaequaliter distantibus; margine suturali simplici, vix distincto; ultimo anfractu elongato, basi attenuato, tenue et obsolete striato; apertura elongata, angusta, canali longo, recto terminata, late profundeque emarginata; columella cylindraco-conica.*

Hab. les îles Marquises.

Très-belle espèce, voisine du *Cingulifera* de Lamarck; elle est étroite, allongée, subulée, composée de vingt-sept à vingt-huit tours étroits, partagés par un sillon peu apparent et portant un petit nombre de stries transverses, inégalement distantes et faiblement imprimées dans l'épaisseur du têt. Les premiers tours sont plans et les suivants deviennent légèrement convexes; le dernier tour est allongé, atténué à la base, et de ce côté les stries sont plus fines et plus serrées. L'ouverture est allongée, un peu oblique, étroite, terminée par un canal assez long, large et profondément échancré. La columelle, cylindraco-conique, porte un pli obsolète en avant et elle montre au dehors vers le milieu de sa hauteur un angle étroit et aigu. Toute la coquille est d'une couleur uniforme d'un jaune orangé très-pâle; elle a 72 mill. de long et 11 de diamètre.

Collection de M. Cuming.

DESH 1857 p 87



PALLIDA (2)

DESHAYES 1857

PUNCTATOSTRIATA

24

29. *Terebra (Perirhoe) pallida* DESHAYES, 1857

(Plate 5, Figure 19)

- 1857. *Terebra pallida* DESHAYES, Journ. Conchyl., 6: 87, pl. 4, fig. 3
- 1931. *Perirhoe exulta* IREDALE, Rec. Austral. Mus., 18: 224, pl. 25, fig. 3

Shell: Shell large and slender, slightly ventricose; reddish-brown to dark tan in colour throughout. Whorls convexly rounded, numbering 20 to 26, apart from protoconch; presutural band defined by a narrow smooth spiral groove which bisects narrow, obliquely oriented axial ribs; ribs are short, almost obsolete, and confined to the presutural band. Sculpture consists of narrow moderately deep smooth spiral grooves, numbering from 4 to 8 on the penultimate whorl; early whorls with a double row of rounded nodules at the sutures. Body whorl with 14 to 19 fine spiral grooves, grooves somewhat obsolete in central area of body whorl; columella tan in colour, recurved, corded on either side, with a prominent angulate cord extending from the outer edge of the anterior canal; the columella forms a calloused area on the body whorl.

Size: 70 to 102 mm.

Habitat: In clean sand, from 0 - 5 fathoms.

Uncommon.

Distribution: West and South Viti Levu. - Australia, Polynesia.


Discussion: This species has on occasions been associated with *Terebra cingulifera* LAMARCK, but differs from that species in being much larger in size, orange-brown in colour, ventricose, with subulate convexly-rounded whorls and smooth spiral grooves. *CLRN 1966 Tof F p 52*



19

Figure 19: *Terebra pallida* DESHAYES. Fiji. x 0.7

- 197. *T. pallida*, Deshayes, variety of *T. cingulifera*, Lamarck. *KV 1160b*



24b

24b, Lectotype

of *T. pallida* Deshayes, British Museum (N.H.) No. 197967; 71.8 mm.

BRITISH 1977



36. *T. pallida* = *cingulifera*

- 36. *Terebra pallida*, Desh. (= *cingulifera*). Jour. de Conch. 2d ser., ii, t. 4, f. 3, . . . . .

*Pallida* (*Terebra*), Desh. Jour. Conch., 1857, p. 87, pl. iv, f. 3. = *T. cingulifera*, Lam. . . . . 27

THOMSON 1885