

SEE BOUCHET 1982
(RETICULARE)

PSEUDOTURBINELLA
TALAVERA 1975


= RETICULARIS

201



T. Pseudoturbonilla
(Talavera, 1975) 20
mm. - Atlántico
oriental. Localidad
típica Mauritania, An-
gola, Isole di Capo
Verde e del Golfo di
Guinea. Da 20 a 130
m. in sabbia. ***

AUBRY PL3



201e, Paratype of *T. pseudoturbinella*
Talavera, Muséum National d'Histoire
Naturelle Paris; 5.6 mm.

Terebra pseudoturbinella sp. nov.
(Lám. II, fig. 3.)


Concha pequeña, con nueve vueltas de espira algo convexas, las cuatro primeras (embrionarias) lisas y las restantes con costillas longitudinales, algo flexuosas, entre las cuales se puede observar una serie de cordones espirales muy finos y poco señalados. Sutura profunda. La última vuelta presenta bajo la sutura una franja bien diferenciada en la que son cortadas las costillas longitudinales por una estria paralela a la sutura. Columela estrecha y sinuosa en la base. Labro liso. Color crema, con una franja castaño claro bajo la sutura y en la base de la última vuelta. Columela también de color castaño claro.

Localidad.—Tres ejemplares (muertos) procedentes de la estación EO-14.

Dimensiones.—Holotipo: Longitud, 6 mm. Anchura, 1,5 mm.

Observaciones.—Creemos que se trata de la especie más pequeña del género *Terebra*, presente en la costa occidental de Africa. Es necesario resaltar su gran parecido, a simple vista, con el género *Turbonilla*, excepto en la última vuelta, en la que la abertura, columela y labro presentan las características de *Terebra*. La *T. pseudoturbinella* muestra analogías con *T. grayi* E. A. Smith, pero se diferencian notablemente en el tamaño.

TALAVERA 1975 B. INAT-ESP. OCEANO. 1975 p. 5



6



9