

PULCHELLA
 DESH 1857 (15)
 = SPECILLATA

29. TEREBRA PULCHELLA Desh. (Pl. V, fig. 4.)
 194

T. testa elongato-turrita, acuminata, flavida, basi albo cincta; anfractibus planulatis, longitudinaliter arcuatim tenuè plicatis, sulco impresso divisus, sulco utroque latere crenato, margine prominulo, convexo, regulariter plicato; apertura intus flava, elongato, angusta-canali brevi terminata; columella cylindracea, parum obliqua, alba, angulo acuto, perobliquo extus circumdata.

Hab. les mers de Chine.

Très-jolie coquille rapprochée, par sa forme et sa structure, du *Terebra specillata* de M. Hinds. Allongée, très-pointue au sommet, elle se distingue par sa couleur d'un beau fauve pâle, interrompu à la suture par un bourrelet blanc, et à la circonférence du dernier tour par une étroite fascie blanche. Les tours sont assez larges, aplatis et divisés inégalement par un sillon. Le bourrelet est un peu saillant, convexe, élégamment granuleux sur les premiers tours et régulièrement plissé sur tous les autres. La surface est couverte de plis d'une grande régularité, arqués dans leur longueur, commençant sur le bord du sillon transverse par un petit tubercule arrondi. Les interstices des plis sont lisses. L'ouverture est allongée, étroite, terminée en avant par un canal court et une échancrure étroite et profonde. La columelle est cylindracée, oblique et parallèle au bord droit; elle est blanche et vers le milieu de sa hauteur se montre à l'extérieur un angle aigu, très-étroit et très-oblique.



Cette coquille a 40 mill. de long et 8 de diamètre.

Collection de M. Cuming.

DESH 1857 p. 94



T. pulchella Desh.

74. *Terebra pulchella*, Desh. Jour. de Conch., 2d ser., ii, t. 5, f. 4.

Pulchella (*Terebra*), Desh. Jour. Conch., 1857, p. 94, pl. v, f. 4, 20

T. PULCHELLA, Deshayes. Pl. 5, fig. 74.

Light yellowish brown, stained with rust-color, with a white peripheral band; whorls concave, arcuately plaited, without spiral striae, subsutural groove crenate. Length, 43 mill.

TRAYOR 1872 China.

114. TEREBRA PULCHELLA, Desh.

T. testa elongato-turrita, acuminata, flavida, basi albo cincta; anfractibus planulatis, longitudinaliter arcuatim tenuè plicatis, sulco impresso divisus, sulco utroque latere crenato, margine prominulo, convexo, regulariter plicato; apertura intus flava, elongato-angusta, canali brevi terminata; columella cylindracea, parum obliqua, alba, angulo acuto perobliquo extus circumdata.

Long. 40 mill., larg. 8.

Hab. Les mers de la Chine.

Collection Cuming et celle de M. Crosse.

DESH 1857 p. 297

114. *T. pulchella* Desh. J. Conchyl., vi, 94, pl. v, f. 4. China. Type B.M. T44

160. *pulchella*, *Terebra* - DESHAYES, 1857, J. C. P., 6: 94, pl. 5, fig. 4 (non *Epitonium pulchellum* NOODT, 1819). Hab. les mers de la Chine. Coll. Cuming. Size: 40x8 mm. Holotype: 39.2 mm; syntype: 41.2 mm (erroneously marked x inside aperture). C69

*(x) *T. (? Strioterebrum) pulchella* DESHAYES, 1857? Journ. Conchyl., p. 94, pl. 5, fig. 4 (non RÖDING, 1798; non ADAMS & ANGAS, 1863).

Not among the specimens seen. BUREHAY

. Species 71. (Mus. Cuming.)

TEREBRA PULCHELLA. *Ter. testâ subulato-turritâ, flavescente-spadiceâ, ferrugineo sparsim tinctâ, basi albo cinctâ, anfractibus concavo-planatis, longitudinaliter arcuatim tenuiplicatis, sulco supernè divisus, sulco utroque latere crenato, margine prominente, tumido; aperturâ oblongâ, columellâ subrectâ, ad basin paululum recurvo.*

THE PRETTY TEREBRA. Shell subulately turreted, yellowish-fawn, sparingly stained with rust, base banded with white, whorls concavely flattened longitudinally arcuately finely plicated, divided at the upper part by a groove, crenated on each side of the groove, margin prominent, swollen; aperture oblong, columella nearly straight, a little recurved at the base.

DESHAYES, Journ. de Conch. 1857.

Hab. China Seas.

The whorls of this species are peculiarly concave and arcuately plaited, and the margin, which is divided off by the encircling groove, has a swollen appearance.

RUIBICO (71)



71.