

186. *TEREBRA SCABRELLA*, Lamk.

*Terebra scabrella*, Lamk. An. s. Vert. 2 ed. t. x. p. 247. no. 19.  
*Terebra myuros*, var., Kiener, Icon. des Coq. Viv. pl. 14. f. 34 a.  
*Terebra commaculata* (ex parte), Hinds, Thes. Conch. p. 170.  
no. 58, pl. 42. f. 37.  
Hab. Nouvelle Guinée.

DZS4 1859 p 309

SCABRELLA  
LAM 1822  
= *commaculata* (40)  
Scabrella (*Terebra*), Lam. An. s. Vert., 2d ed., x, p. 248.  
Note. = *T. myuros*, Lam. 27

TRYON 1885

*T. (Myurella) scabrella* LAMARCK, 1822: Anim. sans  
Vert., 10: 247, no. 19; Fig.: KIENER; Icon. Coq.  
Viv., 1839, T., pl. 14, fig. 34 a only.

*T. myuros* KIENER, 1839: Icon. Coq. Viv., T., pl. 14,  
fig. 34 a; non fig. 34.

*T. myuros* REEVE, 1860: Conch. Icon., T., no. 31, pl.  
8 (non LAMARCK, 1822).  
BOECHER

A single specimen collected at Luzon (DM no. 3560).

186. *T. scabrella*, Lamarck, variety of *T. myuros*. Lamarck 1816

71. MYURELLA SCABRELLA.

*Terebra scabrella* Lam. (Sow., Th. Conc., pl. XLII, fig. 27).

Hab. — Obock. Un exemplaire trouvé dans les sables des plages  
soulevées, brisé à ses extrémités, mais ayant encore conservé  
des traces de coloration.  
JOUSSEAUME 1880 1887 287

var. *scabrella* Lamarck. (myuros)

LAMARCK. l. c. p. 247.  
KIENER. l. c. p. 41, Pl. 14, fig. 34 a.  
KÜSTER. l. c. p. 21, Pl. 5, fig. 4.  
SOWERBY. l. c. p. 170.  
TRYON. l. c. p. 27 (*myuros* pars).

Stat. 37. Sailus ketjil, Paternoster-islands. 27 M. and less. Coral and coralsand. 1 Spec.  
Stat. 51. Madura-bay, 69—91 M. Fine grey sand, coarse sand with shells and stones. 1 Spec.

All the quoted authors agree that LAMARCK has gone too far by dealing with this shell  
as a separate species. The specimen from Stat. 37 is a young worn shell. SCHLIER 1913 p 368

19. Vis scabrelle. *Terebra scabrella*. Lamk. p 247

*T. testâ turrito-subulatâ, angustâ, scabriusculâ, longitudinaliter  
minutissimè striatâ transversimque sulcatâ, subdecussatâ, albedo-  
cinereâ, flammulis fuscis pictâ; anfractibus convexo-planis; sutu-  
ris bimarginatis : cingulis asperatis.*

\* *Terebra myuros*. Var. Kiener. Spec. des Coq. pl. 14. f. 34 a.  
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. M. Macleay. Mon cabi-  
net. Les deux cordonnets qui accompagnent chaque suture sont  
comme tressés par de petits plis longitudinaux et obliques qui les  
rendent un peu rudes au toucher. Cette espèce a de grands rap-  
ports avec celle qui précède, et n'en diffère presque que par les  
légères aspérités que l'on remarque à sa surface, outre celles de ses  
sutures. Longueur: 25 lignes et demie. D. A. E. 1825 p 247

19. Vis scabrelle. *Terebra scabrella*.

*T. testâ turrito-subulatâ, angustâ, scabriusculâ, longitudinaliter  
minutissimè striatâ transversimque sulcatâ, subdecussatâ, al-  
bido-cinereâ, flammulis fuscis pictâ; anfractibus convexo-pla-  
nis; suturis bimarginatis : cingulis asperatis.*

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. M. Macleay. Mon cabinet.  
Les deux cordonnets qui accompagnent chaque suture sont comme  
tressés par de petits plis longitudinaux et obliques qui les rendent  
un peu rudes au toucher. Cette espèce a de grands rapports avec  
celle qui précède, et n'en diffère presque que par les légères aspé-  
rités que l'on remarque à sa surface, outre celles de ses sutures.  
Longueur, 25 lignes et demie. LAM 1822 p 247

MYUROS