

T. silvanae Aubry, 1999

(n. sp)

Materiale esaminato

n. 2 esemplari raccolti da subacquei dai 18 ai 20 m di profondità, in sabbia presso Nha-Trang, Viet-Nam.

Descrizione

Conchiglia di dimensione media, leggera, lucida, un esemplare misura 22 mm di lunghezza e 4,5 di larghezza, l'altro 21 mm x 4 mm. La protoconca è formata da 2 giri e la teleoconca da 13 giri. Il solco soprasuturale è ben marcato mentre la banda sottosuturale si evidenzia solo per la colorazione marrone chiaro che la demarca.

Infatti, le costole assiali sono il prolungamento di quelle dei giri che sono di colore bianco madreperlaceo e da esse si distinguono solo per la colorazione. La protoconca ed i primi giri sono di colore marrone chiaro molto delicato che sfuma in quel colore bianco madreperlaceo dei giri corporali. Non vi è presenza di strie o strutture spirali. La columella è leggermente ricurva e l'apertura quadrata.

Olotipo

22 mm x 4,5 mm (Pellifroni, coll.)

Paratipo

n. 1 esempl (Aubry, coll.)

Località tipo

Nha-Trang, Viet-Nam

Discussione

T. crakei R.D. Burch, 1965, *T. spectabilis* Hinds, 1844 sono le specie che più facilmente potrebbero essere confuse con *T. silvanae*, ma un'attenta osservazione ne esclude facilmente la conspecificità.

T. silvanae Aubry, 1999

(n. sp)

Material examined

Two specimens found by underwater divers at a depth of 18-20 m. In sand close to Nha-Trang, Viet-Nam.

Description

A shell of average size, light and shiny. The length is of 22 mm and the width of 4.5 mm. The protoconch is formed of 2 whorls and the teleoconch of 13 whorls. The supra-sutural groove is well-marked whilst the sub-sutural band is noticeable only for the light brown colouring that delimits it.

In fact, the axial ribs are an extension of the whitish, mother-of-pearl ones on the whorls and are distinguished from them only by their colouring. The protoconch and the early whorl are of a very delicate light brown colouring that blends into the whitish mother-of-pearl colouring of the body whorl. There are no grooves or spiral structure. The columella is slightly curved and the aperture square.

Holotype

22 x 4,5 mm. (Pellifroni, coll.)

Paratype

n. 1 specimen (Aubry, coll.)

Type locality

Nha-Trang, Viet-Nam

Discussion

T. crakei R.D. Burch, 1965, *T. spectabilis* Hinds, 1844 are the species that could most easily be confused with *T. silvanae*, but a close observation easily excludes synonymity.