

*Myurella simplex.*

*M.* testa rufo-cinerea, minore, minus tereti, epidermide tenui; anfr. xii., planatis; fascia suturali valida, nodosa, tuberculis ovalibus crebris validioribus (anfr. penult. circa xv.) ornata; testa adolescente costulis radiantibus, postea evanescentibus; striolis antice et postice spiralibus, circa peripheriam sæpe obsoletis; basi rotundata; canali brevissimo, alte emarginato; carina supra canalem acuta, columellam plicante; labro acuto, vix undato. Long. 1.03, long. spir. .76, lat. .27, div. 20°.

Variat tuberculis subobsoletis.

399

*Hab.* Sta. Barbara (*Jewett*); S. Pedro (*Cooper*). CARPENTER 1865

SIMPLEX

CARPENTER 1865

= HEMPHILLI (180)

*Myurella simplex.*

*M.* testa rufo-cinerea, minore, minus tereti, epidermide tenui; anfr. xii., planatis; fascia suturali valida, nodosa, tuberculis ovalibus crebris validioribus (anfr. penult. circa xv.) ornata; testa adolescente costulis radiantibus, postea evanescentibus; striolis antice et postice spiralibus, circa peripheriam sæpe obsoletis; basi rotundata; canali brevissimo, alte emarginato; carina supra canalem acuta, columellam plicante; labro acuto, vix undato. Long. 1.03, long. spir. .76, lat. .27, div. 20°.

Variat tuberculis subobsoletis.

*Hab.* Sta. Barbara (*Jewett*); S. Pedro (*Cooper*). CARPENTER 1873 p. 7.