

***T. sorrentensis* Aubry, 1999**
(n. sp.)

Materiale esaminato

n. 3 esemplari raccolti da subacquei i prossimità di Sorrento Beach, West Australia.

Descrizione

Conchiglia piccola ed apparentemente fragile. La lunghezza varia da 6 mm. ad un massimo di 8 mm e la larghezza è di 2 mm, negli esemplari studiati. La protoconca è di 3 giri, la teleoconca di 5 giri con il profilo leggermente convesso. Il solco suturale è ben evidente mentre la banda sottosuturale è definita unicamente dal proseguimento delle costole assiali che ornano i giri e da piccole macchiette scure. Queste costole assiali sono in numero di 12 ed appaiono ben pronunciate. Qualche piccola microscopica stria trasversa è visibile tra le costole. Il colore di fondo è bianco grigio e ciò che caratterizza la conchiglia è la macchiettatura fulva che ricopre gli spazi intercostali, specie anteriormente ai giri, sopra il solco suturale e che ben si evidenzia all'interno dell'apertura. La columella è dritta e l'apertura quadrata.

Olotipo

8 x 2 mm (Aubry, coll.)

Paratipi

n. 2 esempl. (Aubry, coll.)

Località tipo

Sorrento Beach, West Australia.

Discussione

Possono prendersi in considerazione, per qualche somiglianza conchigliare con *T. sorrentensis*, *T. marqueti*, Aubry 1996 ed *H. nana* (Deshayes, 1859), ma le differenze globali sono talmente evidenti che un accostamento tassonomico sia a livello generico che specifico è improponibile.

***T. sorrentensis* Aubry, 1999**
(n. sp.)

Material examined

Three specimens found by underwater divers, near Sorrento Beach, West Australia.

Description

A small, apparently fragile shell. The length varies a minimum of 6 mm and a maximum of 8 mm, and the width is of 2 mm in the specimens studied. The protoconch is of 3 whorls, the teleoconch of 5 whorls with a slightly convex profile. The sutural groove is clearly seen whilst the sub-sutural band is only defined by the continuation of the axial ribs that decorate the whorls, and by small, dark marks. These axial ribs are 12 in number and appear well-pronounced. A few microscopic transversal grooves can be seen between the ribs. The basic colour is whitish grey and what most characterises the shell is the tawny marking that covers the intercostal spaces, especially in front of the twists, above the sutural furrow, and that can easily be seen on the inside of the aperture. The columella is straight and the opening square.

Holotype

8 x 2 mm (Aubry, coll.)

Paratypes

n. 2 specimens (Aubry, coll.)

Type Locality

Sorrento Beach, West Australia.

Discussion

There is some conchological similarity with *T. sorrentensis* and *T. marqueti*, Aubry 1996 and *H. nana* Deshayes, 1859, but the overall differences are so clearly evident that any taxonomical tatching whether at a general or a specific level, is improbable.