

29. *Terebra sowerbyana* Deshayes,
1857

(Pl. 9, figs. 29a-b)

1857 *Terebra sowerbyana* Deshayes, Journ. Conchyl. 6:93,
pl. 3, fig. 8; 1859 Deshayes, Proc. Zool. Soc. Lond. pt.
27:277; 1960 Reeve, Conch. Icon. 12: pl. 4, sp. 63.


Description: Shell to 56 mm; color ivory with a slight rosy tint; outline of whorls moderately convex; subsutural band quite flat, ribbed; axial ribs wide-spaced, not contiguous with those on band; spiral grooves almost obsolete, about 3 per whorl; aperture quadrate; columella extremely recurved, with 2 heavy plications.

Type locality: "Gambia." Evidently an error. Bouchet (pers. comm.) states that this species has not been found in West Africa as yet.

Distribution: Unknown.

Type: Holotype BM(NH) no. 197973; 56.3 mm.

Discussion: This species is known only from the holotype, and the locality is in doubt. 8.29-1 57



T. sowerbyana Deshayes. 29a, Holotype British Museum (N.H.), No. 197973; 56.3 mm. 29b, Middle whorls.

28. TEREBRA SOWERBYANA Desh (Pl. III, fig. 8.)

1973

T. testa conico-elongata, albida vel pallide rufescente; anfractibus latis, planis, sulco impresso divisis, longitudinaliter undato-plicatis, plicis distantibus, angulatis, interstitiis obsolete bi- vel tri-striatis; ultimo anfractu elongato, basi depressiusculo, striis transversalibus distantibus notato; apertura parum obliqua, elongato-angusta, subquadrangulari, antice canali brevi terminata; columella valde contorta, profunde biplicata.

Hab. la mer de Gambie. ??? See *Bouchet* 1982


Belle espèce, rapprochée par sa forme du *Senegalensis*, mais très-différente par tous ses autres caractères. Elle est allongée, conique, assez large à la base, pointue au sommet. Sa spire est composée de dix-sept tours assez larges, partagés en deux parties assez inégales par un sillon transverse. Le bourrelet marginal prend le tiers de la surface. Des plis anguleux prennent naissance sur le bord de ce bourrelet et y produisent des crénelures; interrompus par le sillon, ces plis se continuent sur le reste de la surface des tours et ils gagnent la suture opposée après s'être légèrement courbés dans leur longueur; ils sont anguleux, écartés et leurs interstices paraissent tout à fait lisses; mais, en les examinant avec plus d'attention, on y remarque deux ou trois stries écartées et très-obsoètes. Le dernier tour est allongé, aplati à la base, et il montre quelques stries transverses. L'ouverture est allongée, étroite, peu oblique, subquadrangulaire; elle se termine en avant par un canal court. La columelle est courte, tordue sur elle-même et un sillon médiocre en divise l'épaisseur en deux plis égaux. Cette coquille est blanche, légèrement teintée de roux.



8

Collection de M. Cuming.

DESH 1857 193



63.

Species 63. (Mus. Cuming.)

TEREBRA SOWERBYANA. *Ter. testâ subulato-turritâ, versus basin subventricosâ, eburneâ, carneo pallidè fasciatâ, anfractibus declivi-convexis, supernè sulco impresso latè divisis, longitudinaliter undato-plicatis, plicis distantibus, interstitiis sulcis tenuibus linearibus clathratis; apertura arcuato-oblongâ, columellâ productâ, valdè contortâ.*

SOWERBY'S TEREBRA. Shell subulately turreted, rather ventricose towards the base, ivory-white, encircled with pale flesh tint, whorls slopingly convex, broadly divided round the upper part by an impressed groove, longitudinally wave-plicated, plaits distant, interstices latticed with fine linear grooves; aperture arcuately oblong, columella produced, very much twisted.

DESHAYES, Journ. de Conch. 1857.

Hab. Mouth of the Gambia, West Africa (in sandy mud at low water); Mr. Deal.

A delicate *Cerithium*-like shell, chiefly distinguished by the widely separated arrangement of the longitudinal plaits.

RV 1760

11. TEREBRA SOWERBYANA, Desh.

T. testa conico-elongata, albida vel pallide rufescente; anfractibus latis, planis, sulco impresso divisis, longitudinaliter undato-plicatis, plicis distantibus, angulatis, interstitiis obsolete bi- vel tri-striatis; ultimo anfractu elongato, basi depressiusculo, striis transversalibus distantibus notato; apertura parum obliqua, elongato-angusta, subquadrangulari, antice canali breve terminata; columella valde contorta, profunde biplicata.

Long. 56 mill., larg. 12.

Hab. La mer de Gambie.

Collection Cuming.

DESH 1857 1297



31

T. sowerbyana
= dislocata Desh

31. Terebra Sowerbyana, Desh. (= dislocata). Conch Icon., f. 63,

Sowerbyana (Terebra), Desh. Jour. Conch., 1857, p. 93, pl. iii, fig. 8. = *T. dislocata*, Say, 12/31 19

TR40W 1285

180. *sowerbyana*, *Terebra* - DESHAYES, 1857, J. C. P., 6: 93, plt. 3, fig. 8. Hab. la mer de Gambie ("River Gambia, Mr. Deal" on label). Coll. Cuming. Size: Not given in 1857, 56x12 mm in 1859. Holotype: 56.3 mm.

CE9

11. *T. sowerbyana* Desh. *J. Conchyl.*, vi, 93, pl. iii, f. 8. Gambia. Type B.M.

744